

BRONCOTRIMEX**Oral soluble powder / Polvo soluble oral****Composition:**

Trimethoprim 4 g; Sulfamethoxy pyridazine sodium 20 g; Tetracycline hydrochloride 10 g; Phenylbutazone 0,5 g; Bromhexine hydrochloride 0,1 g; Excipient to 100 g.

Indications and target species:

Bovine¹, swine, ovine¹ and equine².

Treatment of bacterial diseases which affect the respiratory tract (pneumonia, bronchopneumonia, bronchitis), the digestive tract (enteritis, gastro-enteritis, dysentery) and general infections (septicaemia).

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water or mixed with feedstuff. Administer 1 g of BRONCOTRIMEX / 15 kg b.w. / day, for 5 days. Mixed with feedstuff: 1,5-2 kg of BRONCOTRIMEX / ton of feedstuff. Dissolved in drinking water: 1 kg of BRONCOTRIMEX / 1000 litres of water.

Do not administer more than 5 consecutive days.

Withdrawal period:

Meat: 12 days.

Milk: Do not use.



SUPER'S DIANA

Presentation:

Sachets of 100 g in containers of 3 kg.

Bags of 500 g in containers of 20 kg.

Composición:

Trimetoprim 4 g; Sulfametoxipiridacina sódica 20 g; Tetraciclina clorhidrato 10 g; Fenilbutazona 0,5 g; Bromhexina clorhidrato 0,1 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino¹, porcino, ovino¹ y equino².

Enfermedades bacterianas que afectan al aparato respiratorio (neumonía, bronconeumonía, bronquitis), al aparato digestivo (enteritis, gastroenteritis, disenterías) e infecciones generales (septicemia).

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida o mezclado con pienso.

Administrar 1 g de BRONCOTRIMEX / 15 kg p.v./día, durante 5 días.

Para mezclar en pienso: 1,5 – 2 kg de BRONCOTRIMEX / Tm de pienso.

Para disolver en agua de bebida: 1 kg de BRONCOTRIMEX / 1000 litros de agua.

No administrar más de 5 días consecutivos.

Período de supresión:

Carne: 12 días.

Leche: No usar.

Presentación:

Sobres de 100 g en envases de 3 kg.

Bolsas de 500 g en envases de 20 kg.



SUPER'S DIANA