

CEFALIN

Untimely injectable solution / Solución inyectable extemporánea



Composition:

Powder vial: Cefalexin sodium 7,5 g; Dexamethasone sodium phosphate 12,5 mg; Chlorpheniramine maleate 250 mg.

Solvent vial: Sterile solvent to 25 ml.

Indications and target species:

Bovine, swine, ovine and dogs.

Pneumonia, bronchopneumonia, intestinal infections, septicaemia, mastitis, endometritis, cystitis, forunculosis, leptospirosis, osteomyelitis, otitis, acute emphysema, asthma, allergic rhinitis, allergic dermatitis.

Dosage, administration route and use instructions:

Prepare the solution. Intramuscular or slow intravenous route.

.Swine and ovine: 1 ml of CEFALIN / 30 kg b.w., every 24 hours, for 3-5 days.

.Bovine: 1 ml of CEFALIN / 40 kg b.w., every 24 hours, for 3-5 days.

Mastitis: 1ml of CEFALIN / 40 kg b.w., twice a day, for 3-5 days.

.Dogs: 0,33 ml of CEFALIN / 10 kg b.w., every 24 hours, for 3-5 days.

Withdrawal period:

Meat: Swine: 2 days - Ovine: 3 days - Bovine: 4 days.

Milk: Dairy cows: nil - Sheep: not determined.

Presentation:

Box with 1 powder vial and 1 solvent vial of 25 ml.

Composición:

Vial polvo: Cefalexina sódica 7,5 g; Dexametasona fosfato sódico 12,5 mg; Clorfeniramina maleato 250 mg.

Vial disolvente: Disolvente estéril c.s.p. 25 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, porcino, ovino y perros.

Neumonía, bronconeumonía, infecciones intestinales, septicemias, mastitis, endometritis, cistitis, forunculosis, leptospirosis, osteomielitis, otitis, enfisema, asma, rinitis alérgica, dermatitis alérgica.

Dosis, modo y vía de administración:

Preparar la solución. Vía intramuscular o intravenosa lenta.

.Porcino y ovino: 1 ml de CEFALIN / 30 kg p.v., cada 24 horas, de 3 a 5 días.

.Bovino: 1 ml de CEFALIN / 40 kg p.v., cada 24 horas, de 3 a 5 días.

Mastitis: 1 ml de CEFALIN / 40 kg p.v., cada 12 horas, de 3 a 5 días.

.Perros: 0,33 ml de CEFALIN / 10 kg p.v., cada 24 horas, de 3 a 5 días.

Período de supresión:

Carne: Porcino: 2 días – Ovino: 3 días – Bovino: 4 días.

Leche: Vacas: nulo – Ovejas: no determinado.

Presentación:

Caja con 1 vial polvo y 1 vial disolvente de 25 ml.