

DIALINA Injectable suspension / Suspensión inyectable



Composition:

Amoxycillin (trihydrate) 10 g; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Bovine, ovine, swine, dogs and cats.

Infections located in gastrointestinal, respiratory and genitourinary tracts, skin and soft tissues; secondary bacterial complications. All these infections caused by the following Amoxycillin-sensitive microorganisms:

Actinomyces spp., *Actinobacillus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Clostridium spp.*, *Escherichia coli*, *Corynebacterium spp.*, *Fusebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Haemophilus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Moraxella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*

Dosage, administration route and use instructions:

Intramuscular or subcutaneous route. Shake the vial to obtain a homogeneous suspension before injecting.

Administer 0,5 -1 ml of DIALINA per each 10 kg b.w., daily.

Note: Do not administer more than 15 ml per i.m. injection site.

The treatment should not last more than 5 - 7 days. If an improvement is not observed in 48 hours, reconsider the diagnosis.

The dose, as well as the frequency, can be increased according to the veterinary criterion.



Withdrawal period:

Meat: 14 days.

Milk: 48 hours.

Presentation:

Vials of 100 ml and 250 ml.

Composición:

Amoxicilina (trihidrato) 10 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, porcino, perros y gatos.

Infecciones localizadas en los tractos digestivo, respiratorio y urogenital, piel y tejidos blandos; complicaciones bacterianas. Todas ellas infecciones causadas por los siguientes gérmenes sensibles a la Amoxicilina:

Actinomyces spp., *Actinobacillus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Clostridium spp.*, *Escherichia coli*, *Corynebacterium spp.*, *Fusebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Haemophilus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Moraxella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*

Dosis, modo y vía de administración:

Vía intramuscular o subcutánea. Agítese el vial hasta obtener una suspensión homogénea antes de inyectar.

Administrar 0,5-1 ml de DIALINA por cada 10 kg p.v. y día.

Nota: No aplicar más de 15 ml por punto de inyección i.m.

Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5-7 días. Si no se aprecia mejoría en las primeras 48 horas, reconsiderar el diagnóstico.

Se puede aumentar la dosis y/o su frecuencia según criterio veterinario.

Período de supresión:

Carne: 14 días.

Leche: 48 horas.

Presentación:

Viales de 100 ml y 250 ml.

