

FORTDIAN

Untimely injectable solution / Solución inyectable extemporánea



Composition:

Powder vial: Metampicillin sodium 5 g; Cloxacillin sodium 2,5 g.

Solvent vial: Sterile solvent to 25 ml.

Indications and target species:

Bovine, ovine, swine, equine and dogs.

Pneumonia, broncho-pneumonia, intestinal infections, mastitis, conjunctivitis, cystitis, endometritis, furunculosis, leptospirosis, osteomyelitis, otitis, hemorrhagic septicaemia, cutaneous infections, infected wounds and erysipelas.

Dosage, administration route and use instructions:

Prepare the solution. Intramuscular route.

.Young calves, lambs and growing pigs: 0,05 ml of FORTDIAN / 1kg b.w. / day.

.Milking cows, horses and breeding pigs: 10 ml of FORTDIAN / day.

.Dogs: 0,2 ml of FORTDIAN / 1 kg b.w. / day.

The treatment must last from 4 to 5 days.

Withdrawal period:

Meat: 12 days.

Presentation:

Box with 1 powder vial and 1 solvent vial of 25 ml.

Composición:

Vial polvo: Metampicilina sódica 5 g; Cloxacilina sódica 2,5 g.

Vial disolvente: Disolvente estéril c.s.p. 25 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, porcino, equino y perros.

Neumonía, bronconeumonía, infecciones intestinales, mastitis, conjuntivitis, cistitis, endometritis, furunculosis, leptospirosis, osteomielitis, otitis, septicemia hemorrágica, infecciones cutáneas, heridas infectadas y erisipelas.

Dosis, modo y vía de administración:

Preparar la solución. Vía intramuscular.

.Terneros jóvenes, ovinos y cerdos en crecimiento: 0,05 ml de FORTDIAN / 1 kg p.v. / día.

.Vacas, équidos y reproductoras porcinas: 10 ml de FORTDIAN / día.

.Perros: 0,2 ml de FORTDIAN / 1 kg p.v. / día.

El tratamiento debe durar de 4 a 5 días.

Período de supresión:

Carne: 12 días.

Presentación:

Caja con 1 vial polvo y 1 vial disolvente de 25 ml.