

GENDIAN 600
Injectable solution / Solución inyectable



Composition:

Gentamicin (sulphate) 6 g; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

.*Bovine*: Coliform mastitis. Colibacillosis and Salmonellosis in calves. Genitourinary and respiratory tract infections.

.*Equine*²: Colibacillosis and Salmonellosis in foals. Genitourinary and respiratory tract infections.

.*Dogs*: Genito-urinary infections. Respiratory tract infections. Skin and soft tissues infections. Bacterial gastroenteritis. Bacteremia and Septicaemia.

All these infections produced by the following Gentamicin-sensitive germs: Gram (-) bacteria such as *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*; and some Gram (+) bacteria such as *Treponema hyodisenteriae*, *Staphylococcus aureus*, *beta-haemolytic Streptococci*.

Dosage, administration route and use instructions:

Intramuscular or slow intravenous route.

.*Bovine*: 0,33-0,83 ml of GENDIAN 600 / 10 kg b.w. every 8-12 hours, for 3 days.

.*Equine*: 0,33-0,66 ml of GENDIAN 600 / 10 kg b.w. every 8 hours, for 3 days.

.*Dogs*: 0,83 ml of GENDIAN 600 / 10 kg b.w. every 12 hours, for 3-4 days.



Withdrawal period:

Bovine meat: 60 days.

Milk: 3 days.

Presentation:

Vials of 100 ml and 250 ml.

Composición:

Gentamicina (sulfato) 6 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

.*Bovino*: Mastitis coliforme. Colibacilosis y Salmonelosis en terneros. Infecciones genito-urinarias. Infecciones del tracto respiratorio.

.*Equino*²: Colibacilosis y Salmonelosis en potros. Infecciones genito-urinarias. Infecciones del tracto respiratorio.

.*Perros*: Infecciones genito-urinarias. Infecciones del tracto respiratorio. Infecciones de la piel y de tejidos blandos. Gastroenteritis bacterianas. Bacteremias y Septicemias.

Infecciones producidas por los siguientes gérmenes sensibles a la Gentamicina: Bacterias Gram (-) tales como *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*; y algunas bacterias Gram (+) como: *Treponema hyodisenteriae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus beta-hemolíticos*.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía intramuscular o intravenosa lenta.

.*Bovino*: 0,33-0,83 ml de GENDIAN 600 / 10 kg p.v. cada 8 -12 horas, durante 3 días.

.*Equino*: 0,33-0,66 ml de GENDIAN 600 / 10 kg p.v. cada 8 horas, durante 3 días.

.*Perros*: 0,83 ml de GENDIAN 600 / 10 kg p.v. cada 12 horas, durante 3-4 días.

Período de supresión:

Carne de bovino: 60 días.

Leche: 3 días.

Presentación:

Viales de 100 ml y 250 ml.

