

LINCOTRIMEX
Injectable solution / Solución inyectable



Composition:

Sulfamethoxyypyridazine sodium 10 g; Trimethoprim 2 g; Lincomycin (hydrochloride) 2,7 g; Spectinomycin (sulphate) 5,4 g; Bromhexine 230 mg; Guaiacol glyceryl ether 5 g; Eucalyptol 1 g; Chlorpheniramine maleate 300 mg; Dexamethasone sodium phosphate 20 mg; Ephedrine hydrochloride 500 mg; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Bovine¹, swine and ovine¹.

General respiratory diseases as pneumonia, bronchopneumonia, bronchitis, etc., either if they are complicated or not with septicaemia.

Dosage, administration route and use instructions:

Intramuscular route.

In general, administer 2 ml of LINCOTRIMEX per each 15 kg b.w., twice a day.

Withdrawal period:

Meat: 10 days.

Milk: Do not use.

Presentation:

Vials of 100 ml and 250 ml.

Composición:

Sulfametoxipiridacina sódica 10 g; Trimetoprim 2 g; Lincomicina (clorhidrato) 2,7 g; Espectinomicina (sulfato) 5,4 g; Bromhexina 230 mg; Guayacol gliceril éter 5 g; Eucaliptol 1 g; Clorfeniramina maleato 300 mg; Dexametasona fosfato sódico 20 mg; Efedrina clorhidrato 500 mg; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino¹, porcino y ovino¹.

Enfermedades respiratorias en general tales como neumonía, bronconeumonía, bronquitis, etc., cursen o no con septicemia.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía intramuscular.

En general, administrar 2 ml de LINCOTRIMEX por cada 15 kg p.v., dos veces al día.

Período de supresión:

Carne: 10 días.

Leche: No usar.

Presentación:

Viales de 100 ml y 250 ml.