

METOX**Injectable solution / Solución inyectable****Composition:**

Sulfamethoxypridazine sodium 20 g; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

.*Bovine*: Foot infections, Bacterial pneumonia, Omphalitis.

.*Ovine and caprine*: Bacterial pneumonia, Colibacillosis, Pasteurellosis.

.*Swine*: Bacterial pneumonia, Colibacillosis, Atrophic rhinitis, Haemorrhagic septicaemia.

.*Equine*: Metritis, Bacterial pneumonia.

Infections produced by the following sensitive germs:

- Gram (+): *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*

- Gram (-): *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Fusobacterium spp.*

- Protozoa: *Eimeria spp.*

Dosage, administration route and use instructions:

Subcutaneous, intramuscular or intravenous route.

For all target species:

.Initial dose: 2 ml of METOX / 10 kg b.w., the first day.

.Following doses: 1 ml of METOX / 10 kg b.w., every 24 hours, for maximum 5 consecutive days.

**Withdrawal period:**

Meat: 12 days.

Presentation:

Vials of 50 ml and 100 ml.

Composición:

Sulfametoxipiridacina sódica 20 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

.*Bovino*: Infecciones podales, Neumonía bacteriana, Onfalitis.

.*Ovino y caprino*: Neumonía bacteriana, Colibacilosis, Pasteurellosis.

.*Porcino*: Neumonía bacteriana, Colibacilosis, Rinitis atrófica, Septicemia hemorrágica.

.*Equino*: Metritis, Neumonía bacteriana.

Infecciones causadas por los siguientes gérmenes sensibles:

- Gram (+): *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*

- Gram (-): *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Fusobacterium spp.*

- Protozoos: *Eimeria spp.*

Dosis, modo y vía de administración:

Vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

Para todas las especies de destino:

.Dosis inicial: 2 ml de METOX / 10 kg p.v., el primer día.

.Sigüientes dosis: 1 ml de METOX / 10 kg p.v., cada 24 horas, durante máximo 5 días consecutivos.

Período de supresión:

Carne: 12 días.

Presentación:

Viales de 50 ml y 100 ml.

