

## TRIMEXOL Injectable solution / Solución inyectable



### Composition:

Sulfachloropyridazine 20 g; Trimethoprim 4 g; Excipient to 100 ml.

### Indications and target species:

.Bovine: Pneumonia, Diarrhoeas, Metritis.

.Swine: Pneumonia, Diarrhoeas, Colibacillosis, Metritis, Atrophic rhinitis, MMA syndrome.

.Equine: Metritis, Pneumonia.

Infections produced by the following germs:

-Very sensitive: Gram (+): *Streptococcus spp.*; Gram (-): *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Shigella spp.*, *Haemophilus influenzae*, *E. coli*.

- Sensitive: Gram (+): *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*; Gram (-): *Neisseria spp.*, *Klebsiella spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Bordetella spp.*

- Moderately sensitive: Gram (+): *Nocardia spp.*; Gram (-): *Brucella spp.*, *Moraxella spp.*

### Dosage, administration route and use instructions:

Intramuscular or slow intravenous route. Intravenous route is the most suitable for horses.

Administer 1 ml of TRIMEXOL per each 15 kg b.w., for 3-5 days.



### Withdrawal period:

Meat: 21 days.

Milk: 4 days.

### Presentation:

Vials of 100 ml and 250 ml.

### Composición:

Sulfachloropiridacina 20 g; Trimetoprim 4 g; Excipiente c.s.p.100 ml.

### Indicaciones y especies de destino:

.Bovino: Neumonía, Diarreas, Metritis.

.Porcino: Neumonía, Diarreas, Colibacilosis, Metritis, Rinitis atrófica, Síndrome MMA.

.Equino: Metritis, Neumonía.

Infecciones producidas por los siguientes gérmenes:

- Muy sensibles: Gram (+): *Streptococcus spp.*; Gram (-): *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Shigella spp.*, *Haemophilus influenzae*, *E. coli*.

- Sensibles: Gram (+): *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*; Gram (-): *Neisseria spp.*, *Klebsiella spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Bordetella spp.*

- Moderadamente sensibles: Gram (+): *Nocardia spp.*; Gram (-): *Brucella spp.*, *Moraxella spp.*

### Dosis, modo y vía de administración:

Vía intramuscular e intravenosa lenta. La vía intravenosa es la más apropiada para caballos.

Administrar 1 ml de TRIMEXOL por cada 15 kg p.v., durante 3-5 días.

### Período de supresión:

Carne: 21 días.

Leche: 4 días.

### Presentación:

Viales de 100 ml y 250 ml.

