

**TRIMEXOL POTENCIADO**  
**Injectable solution / Solución inyectable**



**Composition:**

Tylosin 5 g; Trimethoprim 4 g; Sulfachloropyridazine 20 g; Excipient to 100 ml.

**Indications and target species:**

Bovine, swine, ovine, equine and dogs.  
Respiratory tract infections (pneumonia, bronchopneumonia, bronchitis) and general infections (septicaemia), produced by both Gram (-) and Gram (+) bacteria.

**Dosage, administration route and use instructions:**

Intramuscular route.  
Administer 1 ml of TRIMEXOL POTENCIADO per each 12 kg b.w..  
A single daily dose for 3-5 days.

**Withdrawal period:**

*Meat:* 21 days.  
*Milk:* 4 days.

**Presentation:**

Vials of 100 ml and 250 ml.

**Composición:**

Tilosina 5 g; Trimetoprim 4 g; Sulfacloropiridacina 20 g; Excipiente c.s.p.100 ml.

**Indicaciones y especies de destino:**

Bovino, porcino, ovino, equino y perros.  
Infecciones del aparato respiratorio (neumonía, bronconeumonía, bronquitis) e infecciones generales (septicemia), producidas por bacterias Gram (-) y Gram (+).

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía intramuscular.  
Administrar 1 ml de TRIMEXOL POTENCIADO por cada 12 kg p.v..  
Una dosis diaria durante 3-5 días.

**Período de supresión:**

*Carne:* 21 días.  
*Leche:* 4 días.

**Presentación:**

Viales de 100 ml y 250 ml.