

**COLISTOP POLVO**  
**Oral soluble powder / Polvo soluble oral**



**Composition:**

Colistin sulphate  $5 \cdot 10^7$  I.U.; Excipient to 100 g.

**Indications and target species:**

Bovine and swine.

Colistin is a polypeptidic antibiotic, extremely effective against Gram (-) germs, mainly *E.coli* and *Salmonella spp.*, germs responsible for a lot of diarrhoeas and resistant to a large number of antibiotics. It has a very high security level due to its low toxicity by oral route.

**Dosage, administration route and use instructions:**

Oral route, in the drinking water or mixed with feedstuff.

*.Calves and swine:* 102.500 I.U. of Colistin / kg b.w., every 12 hours, for 3 days (equivalent to 2,05 g of COLISTOP POLVO / 10 kg b.w.).

**Withdrawal period:**

*Calves meat:* 14 days.

*Pigs meat:* 7 days.

**Presentation:**

Bags of 500 g in containers of 20 kg.

**Composición:**

Colistina sulfato  $5 \cdot 10^7$  U.I.; Excipiente c.s.p. 100 g.

**Indicaciones y especies de destino:**

Bovino y porcino.

Colistina es un antibiótico polipeptídico, tremendamente efectivo sobre gérmenes Gram (-), principalmente *E.coli* y *Salmonellas*, gérmenes causantes de muchas diarreas y resistentes a muchos antibióticos. Al ser muy poco tóxico por vía oral, su nivel de seguridad es muy alto.

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía oral, en el agua de bebida o mezclado con pienso.  
*.Terminos y cerdos:* 102.500 U.I. de Colistina / kg p.v., cada 12 horas, durante 3 días (equivalente a 2,05 g de COLISTOP POLVO / 10 kg p.v.).

**Período de supresión:**

*Carne de terneros:* 14 días.

*Carne de cerdos:* 7 días.

**Presentación:**

Bolsas de 500 g en envases de 20 kg.