

MASTIDIAN JERINGAS

Intramammary oily suspension / Suspensión oleosa intramamaria

**Composition:**

Per each 10 ml syringe:

Cloxacillin sodium 200 mg; Colistin (sulphate) 400.000 I.U.; Excipient to 10 ml.

Indications and target species:

Bovine.

Mastitis produced by *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, enterobacteria, *Pseudomonas spp.* and *Corynebacterium spp.***Dosage, administration route and use instructions:**

Intramammary route. After milking thoroughly, apply the contents of one syringe of MASTIDIAN JERINGAS into each affected quarter and massage the udder to distribute the medication. At the first administration is advisable to treat all quarters, even if some of them are not affected.

Repeat the administration after 24 hours, for 3 or 5 days.

Withdrawal period:

Meat: 4 days.

Milk: 3 days.

Presentation:

Boxes with 4 and 12 syringes of 10 ml.

Drum with 100 syringes of 10 ml.

Composición:

Para cada jeringa de 10 ml:

Cloxacilina sódica 200 mg; Colistina (sulfato) 400.000 U.I.; Excipiente c.s.p. 10 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino.

Mastitis producidas por *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, enterobacterias, *Pseudomonas spp.* y *Corynebacterium spp.***Dosis, modo y vía de administración:**

Vía intramamaria.

Previo ordeño a fondo, se aplica el contenido de una jeringa de MASTIDIAN JERINGAS por cada cuarterón afectado y efectuar a continuación un suave masaje a fin de favorecer y uniformar la difusión del preparado. En la primera administración se aconseja tratar todos los cuarterones, afectados o no.

Repetir el tratamiento a las 24 horas, durante 3 a 5 días.

Período de supresión:

Carne: 4 días.

Leche: 3 días.

Presentación:

Cajas con 4 y 12 jeringas de 10 ml.

Bidón con 100 jeringas de 10 ml.