

**VERMIFOR 2 / 10****Oral soluble powder / Polvo soluble oral****Composition:**

Levamisole (hydrochloride) 3,75 g; Excipient to 100 g.

**Indications and target species:**.Bovine<sup>1</sup>, ovine<sup>1</sup> and swine: Gastrointestinal and pulmonary nematodosis..Poultry<sup>3</sup>: Nematodosis.

All these nematodosis produced by the following parasites:

*Dictyocaulus spp.*, *Protostrongylus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Ostertagia spp.* (except inhibited larvae), *Haemonchus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Chabertia spp.*, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.*, *Uncinaria spp.*, *Toxocara spp.*, *Toxascaris spp.*, *Ancylostoma spp.*, *Ascardia columbae*, *Capillaria spp.*, *Heterakis spp.*, *Amidostomum spp.*

**Dosage, administration route and use instructions:**

Oral route, in the drinking water or add to milk.

.Bovine: 2 g of VERMIFOR 2/10 / 10 kg b.w., in a single dose. From 300 kg b.w. upwards administer a maximum of 60 g, whatever the animal weight is.

.Ovine: 2 g of VERMIFOR 2/10 / 10 kg b.w., in a single dose. From 65 kg b.w. upwards administer a maximum of 12 g, whatever the animal weight is.



.Swine: 2 g of VERMIFOR 2/10 / 10 kg b.w., in a single dose. From 150 kg b.w. upwards administer 9,3 g per each 50 kg that exceeds this weight.

.Poultry: 0,53-0,66 g of VERMIFOR 2/10/kg b.w. in the drinking water for 1 day.

**Withdrawal period:**

Meat: 7 days.

Milk: Do not use.

Eggs: Do not use.

**Presentation:**

Bags of 500 g and 1kg in containers of 20 kg.

**Composición:**

Levamisol (clorhidrato) 3,75 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

**Indicaciones y especies de destino:**.Bovino<sup>1</sup>, ovino<sup>1</sup> y porcino: Nematodosis intestinal y/o pulmonar..Aves<sup>3</sup>: Nematodosis.

Nematodosis producidas por los parásitos siguientes:

*Dictyocaulus spp.*, *Protostrongylus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Ostertagia spp.* (excepto larvas inhibidas), *Haemonchus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Chabertia spp.*, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.*, *Uncinaria spp.*, *Toxocara spp.*, *Toxascaris spp.*, *Ancylostoma spp.*, *Ascardia columbae*, *Capillaria spp.*, *Heterakis spp.*, *Amidostomum spp.*

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía oral, en el agua de bebida o adicionar a la leche.

.Bovino: 2 g de VERMIFOR 2/10 / 10 kg p.v., en dosis única. A partir de 300 kg p.v. administrar un máximo de 60 g, cualquiera que sea el peso del animal.

.Ovino: 2 g de VERMIFOR 2/10 / 10 kg p.v., en dosis única. A partir de 65 kg p.v. administrar un máximo de 12 g, cualquiera que sea el peso del animal.

.Porcino: 2 g de VERMIFOR 2/10 / 10 kg p.v., en dosis única. A partir de 150 kg p.v. administrar un máximo de 9,3 g por cada 50 kg que sobrepase este peso.

.Aves: 0,53-0,66 g de VERMIFOR 2/10 / kg p.v., en el agua de bebida durante 1 día.

**Período de supresión:**

Carne: 7 días.

Leche: No usar.

Huevos: No usar.

**Presentación:**

Bolsas de 500 g y 1kg en envases de 20 kg.

