

GASTROCAP

Oral dispersable powder / Polvo dispersable oral

**Composition:**

Kaolin 50 g; Pectin 2 g; Calcium carbonate 47,98 g; Excipient to 100 g.

Indications and target species:

Bovine, ovine and swine.

Symptomatic treatment of diarrhoea.

When diarrhoea is caused by bacteria, fungi or protozoa, a simultaneous treatment based on antibiotics or chemotherapeutic drugs should be administered.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water or add to milk.

*.Animals of more than 80 kg: 40 g of GASTROCAP per head, twice a day.**.Animals from 40 to 80 kg: 20 g of GASTROCAP per head, twice a day.**.Animals from 20 to 40 kg: 10 g of GASTROCAP per head, twice a day.**.Animals from 5 to 20 kg: 3-5 g of GASTROCAP per head, twice a day.*

Do not administer more than 3-4 consecutive days.

Withdrawal period:

Not required.

Presentation:

Bags of 1 kg in containers of 20 kg.

**Composición:**

Caolín 50 g; Pectina 2 g; Carbonato cálcico 47,98 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino y porcino.

Tratamiento sintomático de las diarreas.

Cuando la diarrea sea debida a infecciones bacterianas, fúngicas o protozoarias, debe aplicarse simultáneamente un tratamiento etiológico a base de quimioterápicos y/o antibióticos.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida o adicionar a la leche.

*.Animales de más de 80 kg: 40 g de GASTROCAP por animal, dos veces al día.**.Animales de 40 a 80 kg: 20 g de GASTROCAP por animal, dos veces al día.**.Animales de 20 a 40 kg: 10 g de GASTROCAP por animal, dos veces al día.**.Animales de 5 a 20 kg: 3-5 g de GASTROCAP por animal, dos veces al día.*

No administrar más de 3-4 días consecutivos.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Bolsas de 1 kg en envases de 20 kg.

