

DEXIANA

Injectable solution / Solución inyectable



Composition:

Dexamethasone (sodium phosphate) 100 mg; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Bovine, ovine, swine, equine and dogs.

- Inflammatory processes caused by infections, allergies, traumatism and other etiologies.

- Shock and circulatory collapse.

.Bovine: - Ketosis.

Dosage, administration route and use instructions:

-Intramuscular, subcutaneous, intravenous route:

.Bovine, ovine, swine and equine: 0,2-0,8 ml of DEXIANA / 10 kg b.w., in single dose.

.Dogs: 0,5-2 ml of DEXIANA / 10 kg b.w., in single dose.

-Intraarticular route:

.Large animals: 2-10 ml of DEXIANA / kg b.w.

.Small animals: 0,5-5 ml of DEXIANA / kg b.w.

If necessary, repeat the administration every 24-48 hours, for maximum 5 days.

Withdrawal period:

Meat: 5 days.

Milk: 3 days.

Presentation:

Vials of 50 ml and 100 ml.

Composición:

Dexametasona (fosfato sódico) 100 mg; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, porcino, equino y perros.

- Inflamaciones originadas por infecciones, alergias, traumatismos u otras etiologías.

- Shock y colapso circulatorio.

.Bovino: - Cetosis.

Dosis, modo y vía de administración:

- Vía intramuscular, subcutánea o intravenosa:

.Bovino, ovino, porcino y equino: 0,2-0,8 ml de DEXIANA / 10 kg p.v., en dosis única.

.Perros: 0,5-2 ml de DEXIANA / 10 kg p.v., en dosis única.

- Vía intraarticular:

.Grandes animales: 2-10 ml de DEXIANA / kg p.v.

.Pequeños animales: 0,5-5 ml de DEXIANA / kg p.v.

Repetir la dosis en caso necesario a intervalos de 24-48 horas, durante un máximo de 5 días.

Período de supresión:

Carne: 5 días.

Leche: 3 días.

Presentación:

Viales de 50 ml y 100 ml.