

**DEXIANA RETARD****Injectable suspension / Suspensión inyectable****Composition:**

Dexamethasone isonicotinate 100 mg; Prednisolone 300 mg; Excipient to 100 ml.

**Indications and target species:**

Bovine, ovine, swine and equine.

Antiinflammatory (arthritis, oedemas, etc). Antistress (shipping fever).

Antiallergic (urticaria, eczema).

**Dosage, administration route and use instructions:**

Deep intramuscular route. Shake the vial to obtain a homogeneous suspension before injecting.

.*Cattle and horses*: 10 ml of DEXIANA RETARD / animal, in single dose.

.*Calves, ovine and swine*: 3-5 ml of DEXIANA RETARD / animal, in single dose.

.*Piglets*: 1 ml of DEXIANA RETARD / animal, in single dose.

The dosage is a single dose but it can be repeated after five days.

**Withdrawal period:**

*Meat*: 8 days.

*Milk*: 1 day.

**Presentation:**

Vials of 50 ml and 100 ml.



SUPER'S DIANA

**Composición:**

Dexametasona isonicotinato 100 mg; Prednisolona 300 mg; Excipiente c.s.p.100 ml.

**Indicaciones y especies de destino:**

Bovino, ovino, porcino y equino.

Antiinflamatorio (artritis, edemas, etc.). Antiestrés (fiebre del viaje).

Antialérgico (urticaria, eczemas).

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía intramuscular profunda. Agítase el frasco hasta obtener una suspensión homogénea antes de inyectar.

.*Bóvidos adultos y equino*: 10 ml de DEXIANA RETARD / animal, en dosis única.

.*Terneros, ovino y porcino*: 3-5 ml de DEXIANA RETARD / animal, en dosis única.

.*Lechones*: 1 ml de DEXIANA RETARD / animal, en dosis única.

La dosis es única pero puede repetirse a los 5 días.

**Período de supresión:**

*Carne*: 8 días.

*Leche*: 1 día.

**Presentación:**

Viales de 50 ml y 100 ml.



SUPER'S DIANA