

## CARDIOTONICO DIANA

### Injectable solution / Solución inyectable



#### Composition:

Pentamethylentetrazole 8 g; Ephedrine hydrochloride 1 g; Strophanthin K 10 mg; Excipient to 100 ml.

#### Indications and target species:

Bovine, ovine and swine.

Respiratory-cardiac tonic indicated in cases of collapse, faintness, weakness, tiredness, coma, post-operative period, dispnea syndromes, asphyxia, oedema, pulmonary congestion, asthma and other heart diseases which are present in some infectious diseases.

#### Dosage, administration route and use instructions:

Intramuscular route. Single dose. It can be injected in 2 separated sites.

Administer 1ml of CARDIOTONICO DIANA per each 15 kg b.w., up to a limit of 30 ml in large animals.

#### Withdrawal period:

*Meat:* 3 days.

*Milk:* 36 hours.

#### Presentation:

Vials of 50 ml and 100 ml.

#### Composición:

Pentametilentetrazol 8 g; Efedrina clorhidrato 1 g; Estrofantina K 10 mg; Excipiente c.s.p. 100 ml.

#### Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino y porcino.

Tónico cardíaco respiratorio indicado en los casos de colapso, desfallecimientos, estados de debilidad, cansancio, coma, periodos post-operatorios, síndromes de dispnea, asfixia, edema, congestiones pulmonares, asma y demás trastornos cardiovasculares presentes en las enfermedades infecciosas.

#### Dosis, modo y vía de administración:

Vía intramuscular. Dosis única que puede administrarse en dos sitios diferentes. Administrar 1 ml de CARDIOTONICO DIANA por cada 15 kg p.v.. No sobrepasar la dosis de 30 ml en grandes animales.

#### Período de supresión:

*Carne:* 3 días.

*Leche:* 36 horas.

#### Presentación:

Viales de 50 ml y 100 ml.