

PROMILEX**Oral solution / Solución oral****Composition:**

Bromhexine (hydrochloride) 2 g; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Bovine¹, swine, equine², dogs and cats.

Respiratory diseases which show an increase of the production of mucus and/or of its viscosity.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water.

.Bovine:

- *Animals of 20-50 kg:* 0,25 ml of PROMILEX / 10 kg b.w., for 5 days.
- *Animals of 200-500 kg:* 0,1-0,25 ml of PROMILEX / 10 kg b.w., for 5 days.

.Swine:

- *Animals of 5-25 kg:* 0,025-0,05 ml of PROMILEX / kg b.w., for 5 days.
- *Animals of 25-100 kg:* 0,25 ml of PROMILEX / 10 kg b.w., for 5 days.

.Equine:

- *Animals of 50-200 kg:* 0,25 ml of PROMILEX / 10 kg b.w., for 5 to 7 days.



SUPER'S DIANA

- *Animals of 200-500 kg:* 0,1-0,25 ml of PROMILEX / 10 kg b.w., for 5 to 7 days.

.*Dogs:* 0,025-0,05 ml of PROMILEX / kg b.w., for 5 days.

.*Cats:* 0,025-0,05 ml of PROMILEX / kg b.w., for 5 days.

Withdrawal period:

Meat: Not required.

Milk: Do not use.

Presentation:

Bottles of 1 litre.

Containers of 5 litres.

Composición:

Bromhexina (clorhidrato) 2 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino¹, porcino, equino², perros y gatos.

Enfermedades respiratorias que presentan un incremento de la producción de mucosidad y/o de su viscosidad.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida.

.Bovino:

- *Animales de 20-50 kg:* 0,25 ml de PROMILEX / 10 kg p.v., durante 5 días.
- *Animales de 200-500 kg:* 0,1-0,25 ml de PROMILEX / 10 kg p.v., durante 5 días.

.Swine:

- *Animales de 5-25 kg:* 0,025-0,05 ml de PROMILEX / kg p.v., durante 5 días.
- *Animales de 25-100 kg:* 0,25 ml de PROMILEX / 10 kg p.v., durante 5 días.

.Equino:

- *Animales de 50-200 kg:* 0,25 ml de PROMILEX / 10 kg p.v., durante 5-7 días.
- *Animales de 200-500 kg:* 0,1-0,25 ml de PROMILEX / 10 kg p.v., durante 5-7 días.

.*Perros:* 0,025-0,05 ml de PROMILEX / kg p.v., durante 5 días.

.*Gatos:* 0,025-0,05 ml de PROMILEX / kg p.v., durante 5 días.

Período de supresión:

Carne: No precisa.

Leche: No usar.

Presentación:

Botellas de 1 litro.

Envases de 5 litros.



SUPER'S DIANA