

VITAMINA AD₃E COMPLEX

Oral solution / Solución oral



Composition:

Vitamin A 100.000 I.U.; Vitamin D₃ 20.000 I.U.; Vitamin E 40 mg;
Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

All species.

Supplement of vitamins used in the following cases:

Stress-after vaccination, transport, etc.-; Convalescence; Decrease in the defences against infection; Sexual frigidity in males; As a growth and production stimulant; As an aid during gestation; Skeletal deformities and other disorders related to fat-soluble vitamins deficiencies.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water, milk or mixed with feedstuff.

Administer 5 ml of VITAMINA AD₃E COMPLEX up to 20 kg b.w., and 3-5 ml more per each additional 20 kg b.w.

Poultry and rabbits: 0,5-1 ml of VITAMINA AD₃E COMPLEX / litre of drinking water.

Withdrawal period:

Not required.



Presentation:

Bottles of 1 litre.

Containers of 5 litres.

Composición:

Vitamina A 100.000 U.I.; Vitamina D₃ 20.000 U.I.; Vitamina E 40 mg;
Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Todas las especies.

Suplemento de vitaminas indicado en los siguientes casos: Estrés-después de vacunaciones, transportes, etc.-; Convalecencia; Disminución de las defensas orgánicas frente a la infección; Frigidez sexual en el macho; Como estimulante del desarrollo y producciones; Como vigorizante en la gestación; Deformidad ósea y otras alteraciones relacionadas con la carencia de vitaminas liposolubles.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida, leche o mezclado con pienso. Administrar 5 ml de VITAMINA AD₃E COMPLEX hasta los 20 kg de p.v., más 3-5 ml por cada 20 kg de p.v. adicionales.

Aves y conejos: 0,5-1 ml de VITAMINA AD₃E COMPLEX / litro de agua de bebida.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Botellas de 1 litro.

Envases de 5 litros.

