

OSMODIAN**Oral soluble powder / Polvo soluble oral****Composition:**

Dextrose 82,6 g; Calcium chloride 300 mg; Sodium chloride 10 g;
Potassium chloride 1 g; Sodium citrate 5 g; Excipient to 100 g.

Indications and target species:

Bovine and swine.

An aid in the replacement of fluids and electrolyte-loss associated with diarrhoeas. Prevention of dehydration. Also useful in the training of the animals to milk replacers feeding.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route. Dissolve in a sufficient quantity of water, or add to milk. As long as the symptoms remain, administer the following doses:
.Calves and pigs: 100 g of OSMODIAN per head, daily.
.Bovine: 200 g of OSMODIAN per head, daily.
.Piglets: 50 g of OSMODIAN per head, daily.
As an aid to milk replacers feeding, administer the first day the dose indicated for diarrhoeal processes.

Withdrawal period:

Not required.

Presentation:

Sachets of 100 g.

Bags of 1 kg in containers of 20 kg.

Composición:

Dextroza 82,6 g; Cloruro cálcico 300 mg; Cloruro sódico 10 g; Cloruro potásico 1 g; Citrato sódico 5 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino y porcino.

Coadyuvante en casos de pérdida de electrolitos y líquidos orgánicos, asociados a diarreas. Prevención de la deshidratación. Está también indicado como paso al aprendizaje de la lactancia artificial.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral. Disolver en cantidad suficiente de agua, o adicionar a la leche. Mientras dure la enfermedad administrar:

.Terneros y cerdos: 100 g de OSMODIAN por animal y día.

.Bóvidos: 200 g de OSMODIAN por animal y día.

.Lechones: 50 g de OSMODIAN por animal y día.

Para ayuda de la lactancia artificial administrar en el primer día la dosis descrita para el proceso diarréico.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Sobres de 100 g.

Bolsas de 1 kg en envases de 20 kg.