

**SUPERSAN POLVO**

Oral soluble powder / Polvo soluble oral

**Composition:**

Vitamin A 450.000 I.U.; Vitamin D<sub>3</sub> 56.000 I.U.; Vitamin E 100 mg; Vitamin B<sub>1</sub> 71 mg; Vitamin B<sub>2</sub> 250 mg; Vitamin B<sub>6</sub> 20 mg; Vitamin B<sub>12</sub> 0,75 mg; Vitamin K 100 mg; Calcium pantothenate 500 mg; Nicotinic acid 1 g; Aspartic acid 2,4 g, Threonine 800 mg; Serine 1,2 g; Glutamic acid 3,5 g; Glycine 2 g; Proline 1,9 g; Alanine 1,9 g; Cystine 100 mg; Valine 700 mg; Methionine 400 mg; Isoleucine 600 mg; Leucine 1,9 g; Tyrosine 800 mg; Phenylalanine 800 mg; Tryptophan 200 mg; Lysine 1,3 g; Histidine 500 mg; Arginine 700 mg; Excipient to 100 g.

**Indications and target species:**

Bovine, ovine, swine, poultry and rabbits.

Cases of stress, convalescence, loss of appetite, decrease in organic defences against infection, hepatic failure. As a growth stimulant for under-developed animals. As an aid during gestation, lactation and several illnesses. After vaccination and transport. Artificial feeding in suckling animals.

**Dosage, administration route and use instructions:**

Oral route, mixed with milk or feedstuff.

In general, from 1 to 2 g of SUPERSAN POLVO / kg b.w., for 4-6 days.

*Poultry and rabbits:* 5-8 g of SUPERSAN POLVO / kg of feedstuff.



*Suckling calves:* 100 g of SUPERSAN POLVO / kg of powder milk.

*Adult animals:* 100 g of SUPERSAN POLVO / kg of feedstuff.

**Withdrawal period:**

Not required.

**Presentation:**

Bags of 1 kg in containers of 20 kg.

**Composición:**

Vitamina A 450.000 U.I.; Vitamina D<sub>3</sub> 56.000 U.I.; Vitamina E 100 mg; Vitamina B<sub>1</sub> 71 mg; Vitamina B<sub>2</sub> 250 mg; Vitamina B<sub>6</sub> 20 mg; Vitamina B<sub>12</sub> 0,75 mg; Vitamina K 100 mg; Pantotenato cálcico 500 mg; Ácido nicotínico 1 g; Ácido aspártico 2,4 g; Treonina 800 mg; Serina 1,2 g; Ácido glutámico 3,5 g; Glicina 2 g; Prolina 1,9 g; Alanina 1,9 g; Cistina 100 mg; Valina 700 mg; Metionina 400 mg; Isoleucina 600 mg; Leucina 1,9 g; Tirosina 800 mg; Fenilalanina 800 mg; Triptófano 200 mg; Lisina 1,3 g; Histidina 500 mg; Arginina 700 mg; Excipiente c.s.p. 100 g.

**Indicaciones y especies de destino:**

Bovino, ovino, porcino, aves y conejos.

Casos de estrés, convalecencia, pérdida de apetito, disminución de las defensas orgánicas frente a la infección, insuficiencia hepática. Estimulante del desarrollo para animales retrasados. Como vigorizante en la gestación, lactancia y diversas enfermedades. Después de vacunaciones y transportes. En la alimentación artificial de lactantes.

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía oral, mezclado con leche o pienso.

En general, de 1 a 2 g de SUPERSAN POLVO por kg p.v., durante 4-6 días.

*Aves y conejos:* 5-8 g de SUPERSAN POLVO / kg de pienso.

*Terminos lactantes:* 100 g de SUPERSAN POLVO / kg de leche en polvo.

*Animales adultos:* 100 g de SUPERSAN POLVO / kg de pienso.

**Período de supresión:**

No precisa.

**Presentación:**

Bolsas de 1 kg en envases de 20 kg.

