

SUPERSAN SOLUBLE

Oral solution / Solución oral



Composition:

Vitamin A 600.000 I.U ; Vitamin D₃ 50.000 I.U. ; Vitamin E 100 mg; Vitamin B₁ 100 mg; Vitamin B₂ 100 mg; Vitamin B₆ 200 mg; Vitamin B₁₂ 1,5 mg; Vitamin K 200 mg; Calcium pantothenate 500 mg; Nicotinic acid 1 g; Glutamic acid 1,4 g; Aspartic acid 960 mg; Arginine 270 mg; Cystine 760 mg; Lysine 500 mg; Histidine 220 mg; Glycine 810 mg; Serine 480 mg; Alanine 700 mg; Tyrosine 340 mg; Threonine 320 mg; Phenylalanine 340 mg; Valine 270 mg; Methionine 250 mg; Leucine 760 mg; Isoleucine 250 mg; Tryptophan 100 mg; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Bovine, ovine, swine, poultry and rabbits.

Cases of stress, convalescence, loss of appetite, decrease in organic defences against infection, sexual frigidity in males, hepatic failure. As a growth stimulant for under-developed animals. As an aid during gestation, lactation and several illnesses. After vaccination and transport. Artificial feeding in suckling animals.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water, milk or mixed with feedstuff.
Shake before using.



SUPER'S DIANA

Administer 0,33 ml of SUPERSAN SOLUBLE up to 20 kg b.w., and 0,33 ml more per each 20 kg exceeding that weight. A dose of 0,03 ml per kg b.w. can be administered in serious cases.

Birds and rabbits: 0,07-0,13 ml of SUPERSAN SOLUBLE / litre of drinking water.

Withdrawal period:

Not required.

Presentation:

Bottles of 1 litre.

Containers of 5 litres.

Composición:

Vitamina A 600.000 U.I.; Vitamina D₃ 50.000 U.I.; Vitamina E 100 mg; Vitamina B₁ 100 mg; Vitamina B₂ 100 mg; Vitamina B₆ 200 mg; Vitamina B₁₂ 1,5 mg; Vitamina K 200 mg; Pantotenato cálcico 500 mg; Ácido nicotínico 1 g; Ácido glutámico 1,4 g; Ácido aspártico 960 mg; Arginina 270 mg; Cistina 760 mg; Lisina 500 mg; Histidina 220 mg; Glicina 810 mg; Serina 480 mg; Alanina 700 mg; Tirosina 340 mg; Treonina 320 mg; Fenilalanina 340 mg; Valina 270 mg; Metionina 250 mg; Leucina 760 mg; Isoleucina 250 mg; Triptófano 100 mg; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, porcino, aves, y conejos.

Casos de estrés, convalecencia, pérdida de apetito, disminución de las defensas orgánicas frente a la infección, frigidez sexual en el macho, insuficiencia hepática. Estimulante del desarrollo para animales retrasados. Como vigorizante en la gestación, lactancia y diversas enfermedades. Después de vacunaciones y transportes. En la alimentación artificial de lactantes.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida, leche o mezclado con pienso. Agitar antes de usar.

Administrar 0,33 ml de SUPERSAN SOLUBLE hasta los 20 kg p.v., más 0,33 ml por cada 20 kg p.v. adicionales. En caso necesario puede alcanzarse la dosis de 0,03 ml por kg p.v.

Aves y conejos : 0,07-0,13 ml de SUPERSAN SOLUBLE / litro de agua de bebida.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Botellas de 1 litro.

Envases de 5 litros.



SUPER'S DIANA