

**SUPERSCHOC****Oral soluble powder / Polvo soluble oral****Composition:**

Vitamin A 900.000 I.U.; Vitamin D<sub>3</sub> 112.500 I.U.; Vitamin E 200 mg;  
 Vitamin B<sub>1</sub> 150 mg; Vitamin B<sub>2</sub> 500 mg; Vitamin B<sub>6</sub> 40 mg; Vitamin B<sub>12</sub>  
 1,5 mg; Vitamin K 200 mg; Calcium pantothenate 1 g; Nicotinic acid  
 2 g; Excipient to 100 g.

**Indications and target species:**

Bovine, ovine, swine, poultry and rabbits.  
 Vitamin supplement for stress periods, gestation, lactation and illnesses.  
 Convalescence, loss of appetite, vitamin deficiencies. After vaccination  
 and transport.

**Dosage, administration route and use instructions:**

Oral route, in the drinking water, milk or mixed with feedstuff.

*.Bovine:* 10-15 g of SUPERSCHOC, daily.

*.Swine and ovine:* 1 g of SUPERSCHOC / 20 kg b.w., daily.

*.Poultry and rabbits:* 5 g of SUPERSCHOC / litre of drinking water.

Administer for 1 or 2 days. If necessary, repeat the treatment after 2 weeks.

**Withdrawal period:**

Not required.

**Presentation:**

Bags of 1 kg in containers of 20 kg.

**Composición:**

Vitamina A 900.000 U.I.; Vitamina D<sub>3</sub> 112.500 U.I.; Vitamina E 200 mg;  
 Vitamina B<sub>1</sub> 150 mg; Vitamina B<sub>2</sub> 500 mg; Vitamina B<sub>6</sub> 40 mg; Vitamina  
 B<sub>12</sub> 1,5 mg; Vitamina K 200 mg; Pantotenato cálcico 1 g; Ácido nicotínico  
 2 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

**Indicaciones y especies de destino:**

Bovino, ovino, porcino, aves y conejos.

Suplemento vitamínico indicado en casos de estrés, lactancia, gestación  
 y enfermedades diversas. Convalecencias, pérdida del apetito y  
 deficiencias vitamínicas. Después de vacunaciones y transportes.

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía oral, disuelto en el agua de bebida, leche o mezclado con pienso.

*.Bovino:* 10-15 g de SUPERSCHOC por día.

*.Porcino y ovino:* 1 g de SUPERSCHOC / 20 kg p.v. y día.

*.Aves y conejos:* 5 g de SUPERSCHOC / litro de agua de bebida.

Suministrarlo durante 1 ó 2 días. Si es necesario el tratamiento puede  
 repetirse a los 15 días.

**Período de supresión:**

No precisa.

**Presentación:**

Bolsas de 1 kg en envases de 20 kg.

