

SUPERSTIP EQUIDOS

Oral powder / Polvo oral



Composition:

Calcium (carbonate) 2,65 g; Methionine 500 mg; Lysine 2,25 g; Tryptophan 450 mg; Threonine 1,35 g; Linoleic acid 9 g; Oleic acid 4,45 g; Linolenic acid 2,48 g; Vitamin A 20.000 I.U.; Vitamin D₃ 4.000 I.U.; Vitamin E 450 mg; Vitamin B₁ 25 mg; Vitamin B₂ 25 mg; Vitamin B₆ 12,5 mg; Panthotenic acid 125 mg; Niacin 125 mg; Folic acid 17,5 mg; Biotin 1,25 mg; Sulphur 375 mg; Iron (sulphate) 125 mg; Copper (sulphate) 22,5 mg; Iodine (potassium iodide) 0,25 mg; Manganese (sulphate) 100 mg; Selenium (sodium selenite) 0,25 mg; Zinc (oxide) 100 mg; Magnesium (oxide) 125 mg; BHT and BHA 620 mg; Vegetable excipient to 100 g.

Indications and target species:

Equine.

Vitamin mineral supplement for horses of all ages and physiological states.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with feedstuff.

.Adult horses subjected to a light work and/or mares not in lactation during the first 8 months of gestation: 50 g (one measure) of SUPERSTIP EQUIDOS per day, distributed over the feedstuff.



.Growing foals, mares in lactation or during the last 3 months of gestation, horses subjected to an intensive work and recovering from diseases: 100 g of SUPERSTIP EQUIDOS per day (two measures), distributed over the feedstuff.

.In ponies the dose is reduced to half of that in horses, applying the same criteria of dosage.

Withdrawal period:

Not required.

Presentation:

Containers of 3 kg.

Composición:

Calcio (carbonato) 2,65 g; Metionina 500 mg; Lisina 2,25 g; Triptófano 450 mg; Treonina 1,35 g; Ácido linoleico 9 g; Ácido oleico 4,45 g; Ácido linolénico 2,48 g; Vitamina A 20.000 U.I.; Vitamina D₃ 4.000 U.I.; Vitamina E 450 mg; Vitamina B₁ 25 mg; Vitamina B₂ 25 mg; Vitamina B₆ 12,5 mg; Ácido pantoténico 125 mg; Niacina 125 mg; Ácido fólico 17,5 mg; Biotina 1,25 mg; Sulfuro 375 mg; Hierro (sulfato) 125 mg; Cobre (sulfato) 22,5 mg; Yodo (yoduro potásico) 0,25 mg; Manganeso (sulfato) 100 mg; Selenio (selenito sódico) 0,25 mg; Zinc (óxido) 100 mg; Magnesio (óxido) 125 mg; BHT y BHA 620 mg; Excipiente vegetal c.s.p. 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

Equino.

Suplemento vitamínico mineral para équidos de todas las edades y estados fisiológicos.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con el pienso.

.Caballos adultos sometidos a un régimen de trabajo ligero y/o yeguas no lactantes durante los 8 primeros meses de gestación: 50 g (una medida) de SUPERSTIP EQUIDOS al día, distribuido sobre el pienso.

.Potros en crecimiento, yeguas en lactación o durante los tres últimos meses de gestación, caballos sometidos a un régimen de trabajo intenso y en período de recuperación después de enfermedades: 100 g (dos medidas) de SUPERSTIP EQUIDOS al día, distribuido sobre el pienso.

.En ponis se reducirá la dosis para caballos a la mitad, aplicando los mismos criterios de dosificación.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Envases de 3 kg.

