

DIAFER Injectable solution / Solución inyectable



Composition:

Iron-dextran 10 g; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Piglets.

Prophylaxis and treatment of iron deficiency anaemia.

Dosage, administration route and use instructions:

Deep intramuscular route.

.Prevention: Between the 1st and 4th day after birth: 1-1,5 ml of DIAFER per animal, in a single dose.

If necessary, the dose can be repeated two weeks later.

.Treatment: 1-2 ml of DIAFER per animal, in a single dose.

If necessary, the dose can be repeated after 10-15 days.

Withdrawal period:

Not required.

Presentation:

Vials of 100 ml.

Composición:

Hierro-dextrano 10 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Lechones.

Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía intramuscular profunda.

.Prevención: Entre 1^º y 4^º día de edad: 1-1,5 ml de DIAFER por animal, en dosis única. Si es necesario, puede repetirse la dosis a las dos semanas de edad.

.Tratamiento: 1-2 ml de DIAFER por animal, en dosis única. Si es necesario, repetir la dosis a los 10 - 15 días.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Viales de 100 ml.