

FEED-EXTRACT**Injectable solution / Solución inyectable****Composition:**

Aspartic acid 960 mg; Threonine 320 mg; Serine 480 mg; Glutamic acid 1,40 g; Glycine 810 mg; Proline 760 mg; Alanine 730 mg; Cystine 40 mg; Valine 280 mg; Methionine 250 mg; Isoleucine 250 mg; Leucine 760 mg; Tyrosine 340 mg; Phenylalanine 340 mg; Tryptophan 100 mg; Lysine 500 mg; Histidine 220 mg; Arginine 270 mg; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Bovine, ovine and swine.

Treatment and prevention of stress conditions. Growth stimulant for under-developed animals. As immunostimulation against infection. As an aid during gestation and lactation. In cases of convalescence, loss of appetite, hepatic failure and several illnesses. After vaccination and transport.

Dosage, administration route and use instructions:

Intramuscular route.

Administer 5 ml of FEED EXTRACT up to 20 kg b.w., and 5 ml per each additional 20 kg b.w.. In serious cases the dose can be 0,5 ml of FEED EXTRACT per kg b.w.

Withdrawal period:

Not required.

**Presentation:**

Vials of 250 ml.

Composición:

Ácido aspártico 960 mg; Treonina 320 mg; Serina 480 mg; Ácido glutámico 1,40 g; Glicina 810 mg; Prolina 760 mg; Alanina 730 mg; Cistina 40 mg; Valina 280 mg; Metionina 250 mg; Isoleucina 250 mg; Leucina 760 mg; Tirosina 340 mg; Fenilalanina 340 mg; Triptófano 100 mg; Lisina 500 mg; Histidina 220 mg; Arginina 270 mg; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino y porcino.

Tratamiento y prevención de situaciones de estrés. Favorecedor del desarrollo para animales retrasados. Inmunoestimulación frente a la infección. Vigorizante en la gestación y lactancia. En casos de convalecencias, pérdida del apetito, insuficiencia hepática y enfermedades diversas. Después de vacunaciones y transportes.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía intramuscular.

Administrar 5 ml de FEED EXTRACT hasta los 20 kg p.v., más 5 ml por cada 20 kg. p.v. adicionales. En casos graves puede alcanzarse la dosis de 0,5 ml de FEED EXTRACT por kg p.v.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Viales de 250 ml.

