

**SUIDOX****Oral soluble powder / Polvo soluble oral****Composition:**

Doxycycline (hyclate) 50 g; Excipient to 100 g.

**Indications and target species:**

Feeding pigs.

C.R.D. (Chronic respiratory disease) produced by *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* and/or *Bordetella bronchiseptica*, germs sensitive to Doxycycline.

**Dosage, administration route and use instructions:**

Oral route, in the drinking water.

Administer 10 mg of Doxycycline per each kg b.w., daily. This dosage is achieved by administering 0,2 g of SUIDOX / litre of drinking water / day (equivalent to 100 mg of Doxycycline/litre drinking water / day). Adjust the concentration of the antibiotic according to the daily water consumption.

The treatment must last 5 days.

It is recommended to change the medicated water every 12 hours.

**Withdrawal period:**

*Meat*: 7 days.

**Presentation:**

Bags of 1 kg.

**Composición:**

Doxiciclina (hiclato) 50 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

**Indicaciones y especies de destino:**

Cerdos de cebo.

Complejo Respiratorio Porcino donde se encuentren implicados *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* y/o *Bordetella bronchiseptica*, sensibles a la Doxiciclina.

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía oral, en el agua de bebida.

Administrar 10 mg de Doxiciclina por kg p.v. y día. Dicha posología se consigue administrando el producto a la concentración de 0,2 g de SUIDOX / litro de agua / día (equivalente a 100 mg de Doxiciclina / litro de agua de bebida / día). La concentración de antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua. La duración del tratamiento será de 5 días.

Se recomienda renovar el agua medicada cada 12 horas.

**Período de supresión:**

*Carne*: 7 días.

**Presentación:**

Bolsas de 1 kg.