

**SUEROMIN****Injectable solution / Solución inyectable****Composition:**

Glucose 2,5 g; Fructose 2,5 g; Chloride 262 mg; Sodium 157 mg; Potassium 8 mg; Magnesium 2 mg; Calcium 4 mg; Sterile water to 100 ml.

**Indications and target species:**

Bovine, ovine, swine, equine, caprine, dogs and cats.  
Dehydration states. Enteric processes with diarrhoea, together with the corresponding antiinfectious therapy. In general, whenever large losses of organic liquids occur.

**Dosage, administration route and use instructions:**

Slow intravenous, intramuscular, subcutaneous or intraperitoneal route.

Administer from 20 to 80 ml of SUEROMIN per each kg b.w., one or two times a day depending on the seriousness.

**Withdrawal period:**

Not required.

**Presentation:**

Pack with 10 vials of 500 ml.

**Composición:**

Glucosa 2,5 g; Fructosa 2,5 g; Cloruro 262 mg; Sodio 157 mg; Potasio 8 mg; Magnesio 2 mg; Calcio 4 mg; Agua p.i. c.s.p. 100 ml.

**Indicaciones y especies de destino:**

Bovino, ovino, porcino, equino, caprino, perros y gatos.  
Estados de deshidratación. Procesos entéricos que cursan con diarrea, junto a la terapéutica antiinfecciosa adecuada. En general, siempre que haya habido fuertes pérdidas de líquidos orgánicos.

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía intravenosa lenta, intramuscular, subcutánea o intraperitoneal.  
Administrar de 20 a 80 ml de SUEROMIN por kg p.v., una o dos veces al día según gravedad.

**Período de supresión:**

No precisa.

**Presentación:**

Envase con 10 viales de 500 ml.