

**BIODIAN H. G. PLUS**

Oral premix powder / Polvo premezcla oral

**Composition:**

Methionine 40 g; Glucose 23 g; Choline 20 g; Zinc 20 g; Atomized yeast 758 g; Excipient to 1 kg.

**Indications and target species:**

Bovine, swine and poultry.

Growth and production stimulant. Coadjuvant of all kind of treatments, convalescence, stress situations.

**Dosage, administration route and use instructions:**

Oral route, mixed with feedstuff.

*.Swine:* 1,5 kg of BIODIAN H. G. PLUS / ton of starter feed and at finishing feed.

*.Poultry:* 1,5 kg of BIODIAN H. G. PLUS / ton of feed for broilers and laying hens.

*.Bovine:* *Milk replacers:* 2,5 kg of BIODIAN H. G. PLUS / ton of feedstuff.

*Dairy cows:* 1,5 kg of BIODIAN H. G. PLUS / ton of feedstuff.

*Calves:* 2,5 kg of BIODIAN H. G. PLUS / ton of feedstuff (last two months).

**Withdrawal period:**

Not required.

**Presentation:**

Bags of 1 kg in containers of 20 kg.

Sacks of 30 kg.

**Composición:**

Metionina 40 g; Glucosa 23 g; Colina 20 g; Zinc 20 g; Levadura atomizada 758 g; Excipiente c.s.p. 1 kg.

**Indicaciones y especies de destino:**

Bovino, porcino y aves.

Estimulante del crecimiento y producciones. Coadyuvante en tratamientos de todo tipo, convalecencias, situaciones de estrés.

**Dosis, modo y vía de administración:**

Vía oral, mezclado con el pienso.

*.Porcino:* 1,5 kg de BIODIAN H. G. PLUS / Tm de piensos de arranque y al final del cebo.

*.Aves:* 1,5 kg de BIODIAN H. G. PLUS / Tm de pienso para broilers y ponedoras.

*.Bovino:* *Leches maternizadas:* 2,5 kg de BIODIAN H. G. PLUS / Tm de pienso.

*Vacas lecheras:* 1,5 kg de BIODIAN H. G. PLUS / Tm de pienso.

*Cebo de terneros:* 2,5 kg de BIODIAN H. G. PLUS / Tm de pienso (dos últimos meses).

**Período de supresión:**

No precisa.

**Presentación:**

Bolsas de 1 kg en envases de 20 kg.

Sacos de 30 kg.

