

BIODIAN LÍQUIDO**Oral liquid premix / Premezcla líquida oral****Composition:**

Methionine 3 g; Choline chloride 4 g; Glucose 2 g; Vitamin B₁₂ 1 mg; Propylenglycol 40 ml; Citric acid 10 g; Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

Bovine.

Prevention of acetonemia in dairy cattle and as vitamin, mineral and aminoacidic supplement at the beginning of lactation period and in stress situations.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with the daily ration.

Dairy cows during the post-partum period:

Administer from 200 to 500 ml of BIODIAN LIQUIDO per head, twice a day, for 2 to 6 weeks.

Withdrawal period:

Not required.

Presentation:

Bottles of 1 litre.

Containers of 5 litres.

Composición:

Metionina 3 g; Cloruro de colina 4 g; Glucosa 2 g; Vitamina B₁₂ 1 mg; Propilenglicol 40 ml; Ácido cítrico 10 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino.

Prevención de la acetonemia en vacas lecheras y como suplemento vitamínico-mineral y aminoacídico en el post-parto o después de períodos de estrés.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con la ración diaria.

Vacas lecheras, durante el período de post-parto:

Administrar de 200 a 500 ml de BIODIAN LIQUIDO por animal, dos veces al día, durante 2-6 semanas.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Botellas de 1 litro.

Envases de 5 litros.