

RUMEX PLUS**Oral premix powder / Polvo premezcla oral****Composition:**

Sodium 240 g; Niacin 8 g; *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I – 1077; N° CEE 7) $25 \cdot 10^{10}$ CFU; Excipient to 1 kg.

Indications and target species:

Ruminants.

To facilitate and normalise the rumen function. It can also be used as stimulant of the feedstuff ingestion and to favour the fat and protein production in milk.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with feedstuff.

Administer from 0,5 to 1 kg of RUMEX PLUS per ton of feedstuff.

It can be administered during the time necessary for the remission of the symptoms, or as prevention during the feeding or lactation period. The quantity of *Saccharomyces cerevisiae* in the daily ration must not exceed $4,6 \cdot 10^9$ CFU or $8,4 \cdot 10^9$ CFU per 100 kg b.w. for beef cattle or dairy cows, respectively. Add $2 \cdot 10^9$ CFU or $1,8 \cdot 10^9$ CFU per each additional 100 kg b.w. for beef cattle or dairy cows, respectively.

Withdrawal period:

Not required.

**Presentation:**

Bags of 1 kg in containers of 25 kg.

Composición:

Sodio 240 g; Niacina 8 g; *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I – 1077; N° CEE 7) $25 \cdot 10^{10}$ UFC; Excipiente c.s.p. 1 kg.

Indicaciones y especies de destino:

Rumiantes.

Mejora el funcionamiento del rumen. También puede utilizarse como estimulante de la ingestión de pienso y como favorecedor de la producción de grasa y proteína en la leche.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con el pienso.

Administrar de 0,5 a 1 kg de RUMEX PLUS por tonelada de pienso. Puede darse durante el tiempo necesario para remitir los síntomas, o bien, como preventivo durante todo el período de cebo o de lactación. La cantidad de *Saccharomyces cerevisiae* en la ración diaria no debe sobrepasar $4,6 \cdot 10^9$ UFC ó $8,4 \cdot 10^9$ UFC por 100 kg de p.v. para terneros de engorde o vacas lecheras, respectivamente. Añádase $2 \cdot 10^9$ UFC ó $1,8 \cdot 10^9$ UFC por cada 100 kg p.v. adicionales para terneros de engorde o vacas lecheras, respectivamente.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Bolsas de 1 kg en envases de 25 kg.

