

TOCOSEL**Oral premix powder / Polvo premezcla oral****Composition:**

Selenium (methionine selenium) 0,05 g; Vitamin E 75 g; Antioxidant (BHT) 1 g; Excipient to 1 kg.

Indications and target species:

Bovine, ovine, swine, caprine and poultry.

Treatment or prophylaxis of Selenium-Vitamin E deficiency disorders. Mammary infections, placenta retentions and metritis, any stress situation and silent oestrus. To delay the changes of colour, smell and flavour caused by the oxidative processes, which take place during the maturation process of the obtained meat.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with feedstuff.

Administer 1-2 kg of TOCOSEL per ton of feedstuff.

Withdrawal period:

Not required.

Presentation:

Bags of 1 kg in containers of 25 kg.

Composición:

Selenio (metionina de selenio) 0,05 g ; Vitamina E 75 g; Antioxidante (BHT) 1 g; Excipiente c.s.p. 1 kg.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, porcino, caprino y aves.

Tratamiento y profilaxis de los estados carenciales de Vitamina E y Selenio. Infecciones mamarias, retenciones placentarias y metritis, situaciones de estrés y estros silenciosos. Retrasa los cambios de color, olor y sabor producidos por los procesos oxidativos que se dan durante el proceso de maduración de la carne obtenida.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con el pienso.

Administrar 1-2 kg de TOCOSEL por tonelada de pienso.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Bolsas de 1 kg en envases de 25 kg.