

ZINC METIONINA SUPER'S

Oral premix powder / Polvo premezcla oral

**Composition:**

Zinc 10 g; Methionine 20 g; Excipient to 100 g.

Indications and target species:

Bovine, ovine, swine, equine and poultry.

Source of Methionine and Zinc destined to production animals of all ages, as a growth and production stimulant, and in cases of decrease in the fertility.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with feedstuff.

.Swine, laying hens, broilers and turkeys: 360 g of ZINC METIONINA SUPER'S per ton of feedstuff.

.Bovine and equine: 2 g of ZINC METIONINA SUPER'S per animal, on a daily basis.

.Ovine: 0,4 g of ZINC METIONINA SUPER'S per daily ration consumed per head.

Add ZINC METIONINA SUPER'S at double the above recommended amounts in starter and stress rations for cattle and sheep.

Withdrawal period:

Not required.



SUPER'S DIANA

Presentation:

Bags of 1 kg in containers of 5 kg and 30 kg.

Composición:

Zinc 10 g; Metionina 20 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, porcino, equino y aves.

Fuente de Metionina y Zinc destinada a animales de producción en cualquier edad, como estimulante del desarrollo y producciones, y en casos de disminución de la fertilidad.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con el pienso.

.Ganado porcino, ponedoras, broilers y pavos: 360 g de ZINC METIONINA SUPER'S por tonelada de pienso.

.Bovino y equino: 2 g de ZINC METIONINA SUPER'S por animal, diariamente.

.Ovino: 0,4 g de ZINC METIONINA SUPER'S por ración diaria consumida por cabeza.

Añadir ZINC METIONINA SUPER'S en cantidades dobles a las anteriormente indicadas en raciones de arranque y estrés para vacuno y ovino.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Bolsas de 1 kg en envases de 5 kg y 30 kg.



SUPER'S DIANA