

SULFAMETOXIPIRIDACINA
Oral soluble powder / Polvo soluble oral



Composition:

Sulfamethoxyipyridazine sodium 100 g.

Indications and target species:

Bovine, ovine, swine, poultry and rabbits.

Pneumonia, bronchopneumonia, septicaemia, urinary tract infections, enteritis, arthritis, whitlow, omphalitis, metritis and, in general, infectious diseases produced by Sulphamides-sensitive germs.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water, milk or mixed with feedstuff. The first day of treatment administer 5 g of SULFAMETOXIPIRIDACINA / 100 kg b.w. and continue with 2,5-3,5 g of SULFAMETOXIPIRIDACINA / 100 kg b.w. / day, for 3-5 days. In rabbits do not administer more than 3 consecutive days.

Withdrawal period:

Meat: 12 days.

Presentation:

Bags of 500 g in containers of 20 kg.

Composición:

Sulfametoxyipyridacina sódica 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino, ovino, porcino, aves y conejos.

Neumonía, bronconeumonía, septicemia, infecciones de vías urinarias, enteritis, artritis, panadizo, onfalitis, metritis y, en general, para enfermedades infecciosas producidas por gérmenes sensibles a las sulfamidas.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida, leche o mezclado con pienso. Primer día 5 g de SULFAMETOXIPIRIDACINA / 100 kg p.v. y continuar con 2,5-3,5 g de SULFAMETOXIPIRIDACINA / 100 kg p.v. y día, durante los 3 ó 5 días siguientes. En conejos no administrar más de 3 días seguidos.

Período de supresión:

Carne: 12 días.

Presentación:

Bolsas de 500 g en envases de 20 kg.