

OXISAN

Oral medicated premix powder / Polvo premezcla medicamentosa oral



Composition:

Oxytetracycline (hydrochloride) 275 g; Excipient to 1 kg.

Indications and target species:

.*Ruminants*: Bacterial enteritis, Pneumonia, Shipping fever.

.*Swine*: Bacterial enteritis, Atrophic rhinitis, Leptospirosis.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with feedstuff. Mix well in order to assure a homogenous distribution.

.*Ruminants*: Bacterial enteritis: 0,4 kg of OXISAN / ton of feedstuff.

.*Pneumonia*: 1,82 kg of OXISAN / ton of feedstuff. *Shipping fever*: 0,4 kg of OXISAN / ton of feedstuff.

.*Swine*: Bacterial enteritis: 0,4-0,8 kg of OXISAN / ton of feedstuff. *Atrophic rhinitis*: 0,2 kg of OXISAN / ton of feedstuff. *Leptospirosis*: 2 kg of OXISAN / ton of feedstuff.

Withdrawal period:

Meat: 7 days.

Presentation:

Sacks of 25 kg.



SUPER'S DIANA

Composición:

Oxitetraciclina (clorhidrato) 275 g; Excipiente c.s.p. 1 kg.

Indicaciones y especies de destino:

.*Rumiantes*: Enteritis bacterianas, Neumonía, Fiebre del transporte.

.*Cerdos*: Enteritis bacterianas, Rinitis atrófica, Leptospirosis.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con el pienso. Mezclar bien con el pienso para asegurar una distribución homogénea.

.*Rumiantes*: Enteritis bacteriana: 0,4 kg de OXISAN / Tm pienso.

.*Neumonía*: 1,82 kg de OXISAN / Tm pienso. *Fiebre del transporte*: 0,4 kg de OXISAN / Tm pienso.

.*Cerdos*: Enteritis bacteriana: 0,4 - 0,8 kg de OXISAN / Tm pienso. *Rinitis atrófica*: 0,2 kg de OXISAN / Tm pienso. *Leptospirosis*: 2 kg de OXISAN / Tm pienso.

Período de supresión:

Carne: 7 días.

Presentación:

Sacos de 25 kg.



SUPER'S DIANA