

TILOSAN

Oral medicated premix powder / Polvo premezcla medicamentosa oral

**Composition:**

Sulfadimidine (sodium) 20 g; Tylosin (phosphate) 20 g; Excipient to 1 kg.

Indications and target species:

Swine.

Swine dysentery, bacterial enteritis (salmonellosis) or necrotic enteritis by *Salmonella cholera-suis*. In case of enzootic pneumonia or atrophic rhinitis, it maintains weight gain and feed conversion rate. Pneumonia produced by *Pasteurella multocida* and/or *Corynebacterium pyogenes*.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, mixed with feedstuff. Mix well in order to assure a homogenous distribution.

Administer 5 kg of TILOSAN per ton of feedstuff, for 15-30 days.

Withdrawal period:

Meat: 28 days.

Presentation:

Sacks of 25 kg.

Composición:

Sulfadimidina (sódica) 20 g; Tilosina (fosfato) 20 g; Excipiente c.s.p. 1 kg.

Indicaciones y especies de destino:

Porcino.

Disentería porcina, enteritis bacteriana (salmonelosis) o enteritis necrótica por *Salmonella cholera-suis*. En neumonía enzoótica o rinitis atrófica favorece el mantenimiento de la ganancia de peso y del índice de conversión. Neumonías producidas por *Pasteurella multocida* y/o *Corynebacterium pyogenes*.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, mezclado con el pienso. Mezclar bien con el pienso para asegurar una distribución homogénea.

Administrar 5 kg de TILOSAN por tonelada de pienso, durante 15 - 30 días.

Período de supresión:

Carne: 28 días.

Presentación:

Sacos de 25 kg.