

TRIMEXOL SOLUBLE
Oral soluble powder / Polvo soluble oral



Composition:

Sulfamethoxyipyridazine sodium 20 g; Trimethoprim 4 g; Excipient to 100 g.

Indications and target species:

.Bovine: Pneumonia, Diarrhoeas, Metritis.

.Swine: Pneumonia, Diarrhoeas, Colibacillosis, Metritis, Atrophic rhinitis, MMA syndrome.

.Equine: Metritis, Pneumonia.

Infections produced by the following germs:

-Very sensitive: Gram (+): *Streptococcus spp*; Gram (-): *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Shigella spp.*, *Haemophilus influenzae*, *E. coli*.

- Sensitive: Gram (+): *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp*; Gram (-): *Neisseria spp.*, *Klebsiella spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Bordetella spp.*

- Moderately sensitive: Gram (+): *Nocardia spp.*; Gram (-): *Brucella spp.*, *Moraxella spp.*

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water, milk or mixed with feedstuff.

Administer 1 g of TRIMEXOL SOLUBLE per each 15 kg b.w., daily.



Withdrawal period:

Meat: 12 days.

Milk: 4 days.

Presentation:

Bags of 1 kg in containers of 20 kg.

Composición:

Sulfametoxipiridacina sódica 20 g; Trimetoprim 4 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

.Bovino: Neumonía, Diarreas, Metritis.

.Porcino: Neumonía, Diarreas, Colibacilosis, Metritis, Rinitis atrófica, Síndrome MMA.

.Equino: Metritis, Neumonía.

Infecciones producidas por los siguientes gérmenes:

- Muy sensibles: Gram (+): *Streptococcus spp*; Gram (-): *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Shigella spp.*, *Haemophilus influenzae*, *E. coli*.

- Sensibles: Gram (+): *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp*; Gram (-): *Neisseria spp.*, *Klebsiella spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Bordetella spp.*

- Moderadamente sensibles: Gram (+): *Nocardia spp.*; Gram (-): *Brucella spp.*, *Moraxella spp.*

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida, leche o mezclado con pienso.

Administrar 1 g de TRIMEXOL SOLUBLE por cada 15 kg p.v. y día.

Período de supresión:

Carne: 12 días.

Leche: 4 días.

Presentación:

Bolsas de 1 kg en envases de 20 kg.

