



SUIDOX Polvo oral

POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL ADMINISTRADO
EN AGUA DE BEBIDA

COMPOSICIÓN

Doxiciclina (hclato).....	500 mg
Excipiente c.s.p.	1 g

PROPIEDADES

La doxiciclina es un antibiótico perteneciente a la familia de las tetraciclinas. Su actividad bacteriostática impide la síntesis de las proteínas bacterianas como resultado de la fijación a la subunidad 30S de los ribosomas.

A diferencia de las otras tetraciclinas, la doxiciclina posee una mayor biodisponibilidad tras su administración oral, una mayor distribución y penetración en tejidos y secreciones bronquiales; una menor quelación frente a iones divalentes y trivalentes, y una estabilidad superior y más prolongada en agua de bebida.

El ciclo enterohepático de la doxiciclina queda limitado al metabolizarse en hígado, a diferencia de las otras tetraciclinas.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdos de cebo)

INDICACIONES

SUIDOX Polvo oral está indicado para el tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino donde se encuentren implicados *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* y/o *Bordetella bronchiseptica*, sensibles a la doxiciclina.

POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar vía oral, en el agua de bebida.

La posología es de 10 mg de doxiciclina por kg de peso vivo por día. Dicha posología se consigue administrando el producto a la concentración de 0,2 g de SUIDOX Polvo oral por litro de agua, que equivale a 100 mg de doxiciclina/litro de agua de bebida/día. La duración del tratamiento será de 5 días.

Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas. No administrar a animales con alteraciones hepáticas.

REACCIONES ADVERSAS

Al igual que todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Precauciones especiales para su uso en animales

Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

Evitar la administración en bebedores oxidados.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales

No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.

Manipular el producto con cuidado para evitar el contacto durante su incorporación al agua, así como durante la administración del agua medicada a los animales, tomar las precauciones específicas:

- Tomar las medidas adecuadas para evitar la diseminación de polvo durante la incorporación del producto al agua.
- Llevar una mascarilla antipolvo (conforme con la norma EN140FFP1), guantes, mono de trabajo y gafas de seguridad aprobadas.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua clara.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.

Si aparecen síntomas tras exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar dichas advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente.

UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA

No se recomienda su uso durante la gestación y la lactancia.

INTERACCIONES

La absorción de la doxiciclina puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 7 días

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en sitio seco, fresco (temperatura inferior a 25 °C) y protegido de la luz.

PERÍODO DE VALIDEZ

Dos años.

Una vez abierto el envase no utilizar transcurridos tres meses.

Renovar el agua medicada cada 12 horas.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 200 g (para 1.000 litros de agua)

Bolsa de 1.000 g (para 5.000 litros de agua)

Nº Registro: 1585 ESP

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SUPER'S DIANA, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

supersdiana@supersdiana.com

Tel. 93.843.75.36

Fax 93.843.65.45