



TILOSAN

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

COMPOSICIÓN

Sulfadimidina	20 g
Tilosina (fosfato).....	20 g
Excipiente c.s.p.	1 kg

CARACTERÍSTICAS

La sulfadimidina es un antibiótico **bacteriostático** que actúa bloqueando la biosíntesis del ácido fólico, indispensable para la síntesis de los ácidos nucleicos.

Se absorbe rápidamente por vía oral a través del tracto gastrointestinal, y **difunde ampliamente por los tejidos.**

La tilosina es una mezcla de antibióticos macrólidos, constituida principalmente por tilosina A; en la mezcla también están presentes la tilosina B, C y D. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a la subunidad 50S de los ribosomas, impidiendo el acoplamiento de las moléculas del RNA de transferencia.

A altas dosis **actúa como bactericida.**

Después de su absorción en el tracto gastrointestinal, se distribuye ampliamente atravesando las paredes celulares, por lo que **su concentración en tejidos es superior a la sérica.**

ESPECTRO DE ACCIÓN

La asociación es activa frente a:

Gram (-)	Gram (+)	Otros	Espiroquetas
<i>Salmonella</i> spp.	<i>Staphylococcus</i> spp.	<i>Mycoplasma</i> spp.	<i>Treponema hyodysenteriae</i>
<i>E. coli</i>	<i>Streptococcus</i> spp.	<i>Chlamydia</i> spp.	<i>Leptospira</i> spp.
<i>Klebsiella</i> spp.	<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>		
<i>Haemophilus</i> spp.	<i>Corynebacterium pyogenes</i>		
<i>Pasteurella</i> spp.	<i>Clostridium</i> spp.		
<i>Bordetella bronchiseptica</i>			
<i>Fusobacterium necrophorum</i>			

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos

INDICACIONES

TILOSAN está indicado para disentería porcina, enteritis bacteriana (salmonelosis) o enteritis necrótica por *Salmonella choleraesuis*.

En neumonía enzoótica o rinitis atrófica favorece el mantenimiento de la ganancia de peso y del índice de conversión.

Neumonías producidas por *Pasteurella multocida* y/o *Corynebacterium pyogenes*.

POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral, en el pienso, administrar 5 kg de TILOSAN/Tm de pienso, durante 15 - 30 días.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con discrasias sanguíneas o sensibles a las sulfamidas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

La medicación con tilosina puede originar, en algunos casos, edema de la mucosa anal, protrusión anal, eritema y prurito.

La medicación con sulfadimidina puede ocasionar alteraciones en el tracto urinario y riñón: cristaluria, hematuria y obstrucción tubular.

Tratamientos prolongados pueden ocasionar deficiencias en vitamina K.

Puede presentarse intolerancia digestiva con náuseas, vómitos, diarrea y anorexia.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 28 días

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg

Nº Registro: 0953 ESP

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA,
administrado bajo control o supervisión del veterinario

SUPER'S DIANA, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

supersdiana@supersdiana.com

Tel. 93.843.75.36

Fax 93.843.65.45