



FICHA TÉCNICA

1/1

COLISTOP POLVO POLVO HIDROSOLUBLE

Datos del fabricante

SUPER'S DIANA, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail: supersdiana@supersdiana.com

Composición

Colistina sulfato500.000 UI

Excipiente c.s.p. 1 g

Indicaciones y especies de destino

Terneros y cerdos: colibacilosis y salmonelosis, producidas principalmente por *Escherichia coli* y *Salmonella* spp.

Posología y modo de administración

Vía oral, en agua de bebida. Preparar el agua medicada cada 12 horas.

Terneros y cerdos: 102.500 UI/kg p.v. (equivalente a 205 mg de COLISTOP POLVO/kg p.v.) cada 12 horas, durante 3 días.

Contraindicaciones

No administrar a animales con insuficiencia renal.

Utilización durante la gestación y lactancia

No se han descrito contraindicaciones durante estos períodos.

Interacciones

Con miorrelajantes (tubocurarina, suxametonio, pancuronio, galamina) se potencia el bloqueo neuromuscular con riesgo de parálisis respiratoria.

Incompatibilidades

Cationes divalentes (calcio, magnesio, manganeso).

Ácidos grasos insaturados.

Sobredosificación

En caso de sobredosificación aparecen problemas digestivos transitorios como reblandecimiento de heces y timpanismo.

Pueden aparecer signos de neurotoxicidad y nefrotoxicidad.

Tiempo de espera

Carne: Terneros: 14 días

Cerdos: 7 días

Condiciones especiales de conservación

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Nº de Registro: 0647 ESP

Formato

Bolsa de 500 g

USO VETERINARIO

¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí No

05-2012/03