



SUPER'S DIANA, S.L.

FICHA TÉCNICA

VERMIFOR 2/10 POLVO HIDROSOLUBLE ORAL

Datos del fabricante

Super's Diana, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com

Composición

Levamisol (HCl), 3,75 g; Excipiente c.s.p. 100,00 g

Indicaciones y especies de destino

Bovino (no administrar a bovino productor de leche), ovino, porcino y aves (no administrar a aves cuyos huevos se destinen al consumo humano).

Tratamiento de la nematodosis gastrointestinal o pulmonar producidas por los parásitos siguientes: *Dictyocaulus* spp.; *Protostrongylus* spp.; *Trichostrongylus* spp.; *Cooperia* spp.; *Ostertagia* spp. (excepto larvas inhibidas); *Haemonchus* spp.; *Nematodirus* spp.; *Bunostomum* spp.; *Oesophagostomum* spp.; *Chabertia* spp.; *Ascaris suum*; *Strongyloides ransomi*; *Metastrongylus* spp.; *Ascardia columbae*; *Capillaria* spp.; *Heterakis* spp.; *Amidostomum*.

Posología y modo de administración

Vía oral, disuelto en el agua de bebida.

Dosis:

Bóvidos: 2 g de VERMIFOR 2/10 / 10 kg p.v., en dosis única. A partir de 300 kg de p.v. administrar un máximo de 60 g de VERMIFOR 2/10, cualquiera que sea el peso del animal.

Ovinos: 2 g de VERMIFOR 2/10 / 10 kg p.v., en dosis única. A partir de 65 kg de p.v. administrar un máximo de 12 g de VERMIFOR 2/10, cualquiera que sea el peso del animal.

Cerdos: 2 g de VERMIFOR 2/10 / 10 kg p.v., en dosis única. A partir de 150 kg de p.v. administrar un máximo de 9,3 g de VERMIFOR 2/10, por cada 50 kg que sobrepase este peso.

Aves: 0,53 - 0,66 g de VERMIFOR 2/10 / kg p.v., en el agua de bebida durante 1 día.

Contraindicaciones

Evitar la administración en animales depauperados, estresados, con enfermedades intercurrentes o con alteraciones renales o hepáticas muy avanzadas.

No administrar a sementales ni a lechones de peso inferior a 10 kg.

Utilización durante la gestación y lactancia

No administrar a hembras durante el último tercio de la gestación.

Efectos secundarios

Principalmente en bóvidos, óvidos y cerdos se puede presentar dolor abdominal, salivación, tos, náuseas y vómitos.

Interacciones

No administrar compuestos organofosforados o citrato de dietilcarbamacina desde 14 días antes hasta 14 días después de la aplicación del levamisol.

No administrar simultáneamente con compuestos tipo fenotiazina, metiridina o procaína.

Sobredosificación

Los síntomas de intoxicación por sobredosificación se pueden alcanzar con una dosis doble de la recomendada produciéndose síntomas similares a la intoxicación por organofosforados: hiperexcitabilidad, salivación y ligeros temblores musculares. El tratamiento es sintomático.

Tiempo de espera

Carne: 7 días. Leche: No usar. Huevos: No usar.

Período de validez

Período de validez: 3 años

Período de validez del agua medicada: 24 horas

Nº de registro: 0519 ESP

Presentación

Caja de 20 kg, en 20 bolsas de 1 kg.

MANTENER EN LUGAR FRESCO, SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí No

02-2008/02

ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD