



SUPER'S DIANA, S.L.

FICHA TÉCNICA

DOXBROM

POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL ADMINISTRADA EN AGUA DE BEBIDA

Datos del fabricante

Super's Diana, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com

Composición

Doxiciclina (hiclato) 500 mg

Excipiente c.s.p. 1 g

Indicaciones y especies de destino

Aves (pollos de carne).

Colibacilosis, C.R.D. y micoplasmosis producidas por gérmenes sensibles a la doxiciclina: *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* (Coagulasa positivo), *Klebsiella* spp., *Chlamydia* spp., *Mycoplasma* spp., *Bordetella* spp., *Brucella* spp., *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp., *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

Posología y modo de administración

Vía oral

Dosis: 50-100 mg/litro de agua de bebida/día durante 3-5 días (equivalente a 0,1 - 0,2 g de DOXBROM/litro de agua de bebida/día). Esta dosificación equivale a 0,005 – 0,010 g de doxiciclina (hiclato) por kg p.v. y día. El agua medicada será la única fuente de bebida.

Disolver la cantidad necesaria en unos cuantos litros de agua antes de la adición al depósito principal. Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua y pienso depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de pienso y agua.

Precauciones particulares de empleo

Evitar su administración en bebederos oxidados.

No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.

Las personas que manejan el producto deben evitar el contacto con la preparación.

Reacciones adversas

Como para todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.

En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.

Interacciones

La absorción de la doxiciclina se puede disminuir con la presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al de la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

Tiempo de espera

Carne: 7 días.

No usar en aves ponedoras.

Período de validez

Período de validez: 2 años

Período de validez una vez abierto el envase primario: 3 meses

Período de validez del agua medicada: 12 horas

Precauciones especiales de conservación

Conservar en lugar seco, fresco (temperatura inferior a 25 °C) y protegido de la luz.

Presentación

Caja de 10 kg (en 50 bolsas de 200 g)

Caja de 20 kg (en 20 bolsas de 1 kg)

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO

¿Necesita Prescripción Veterinaria?

Sí

No

Nº de Registro: 1408 ESP