



SUPER'S DIANA, S.L.

FICHA TÉCNICA

ESPASMODIAN SOLUCIÓN INYECTABLE

Datos del fabricante

Super's Diana, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com

Composición

Butilbromuro de escopolamina	400 mg
Metamizol sódico	50 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

La asociación de un espasmolítico con un analgésico constituye un producto muy eficaz para el tratamiento de todos los estados espasmódicos dolorosos del tracto intestinal, vías biliares y órganos urogenitales.

ESPASMODIAN persiste en su efecto durante 6 horas, lo que hace que una sola inyección sea normalmente suficiente y se muestre eficaz en los casos de gastroenteritis, eliminando los vómitos y diarreas y disminuyendo los dolores violentos y tenesmos, así mismo manifiesta su acción en los casos de timpanitis de distinta etiología.

Indicaciones y especies de destino

Ganado bovino, porcino y equino no destinado a consumo humano, perros.
Cólicos espasmódicos y hepáticos, vómitos, espasmos del sistema urogenital, diarreas, obstrucciones esofágicas y timpanitis.

Posología y modo de administración

Vía intravenosa lenta o vía intramuscular

Dosis:

<u>Bóvidos y Équidos:</u>	20-25 ml/animal/día
<u>Terneros y Cerdos:</u>	5-10 ml/animal/día
<u>Lechones:</u>	1-2 ml/animal/día
<u>Perros:</u>	1-2,5 ml/animal/día

Contraindicaciones

En casos de glaucoma y retenciones urinarias prostáticas.

Efectos secundarios

Los propios de los atropínicos: hipertensión, mareos, taquicardia.

Interacciones

Con antidepresivos, fenotiazinas barbitúricos. Pero su importancia en clínica veterinaria no está muy establecida.

Incompatibilidades

Con colinérgicos.

Intoxicación por sobredosificación y su tratamiento

La intoxicación se manifiesta por una exageración de los efectos secundarios. El tratamiento normal es con una inyección de 1 ó 2 mg de fisostigmina salicilato.

Período de supresión

No administrar a animales 3 días antes del sacrificio.

Nº de registro: 369/9405

Presentación

Viales de 100 ml

ESPECIALIDAD FARMACOLÓGICA DE USO VETERINARIO MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿Necesita **Prescripción Veterinaria**? Sí No

02-2008/02

ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD