



SUPER'S DIANA, S.L.

FICHA TÉCNICA

1/1

METAMPEN PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Datos del fabricante

SUPER'S DIANA, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail: supersdiana@supersdiana.com

Composición

Metampicilina de sodio..... 300 mg

Cascarilla de almendra y otros excipientes c.s.p. 1 g

Indicaciones y especies de destino

Porcino: Tratamiento terapéutico de procesos infecciosos locales o sistémicos causados por *Streptococcus suis*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis* y *Bacillus anthracis* sensibles a metampicilina.

Posología y modo de administración

Vía oral, mezclado con el pienso.

Dosis:

22,5 mg metampicilina de sodio/kg p.v. durante 15 días consecutivos.

Modo de empleo: Preparar el pienso harina mezclando 1,5 kg de METAMPEN por tonelada de pienso (concentración nominal de 450 ppm, equivalente a 22,5 mg de metampicilina de sodio por kg de peso vivo del animal).

Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad a las penicilinas u otras sustancias del grupo β -lactámico.

No usar en caso de resistencia conocida a la sustancia activa o a otros antibióticos β -lactámicos.

Reacciones adversas

Ocasionalmente pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad, cuya gravedad puede variar desde eritema cutáneo hasta shock anafiláctico. Si aparecen reacciones adversas sospechosas, el tratamiento debe interrumpirse.

Pueden aparecer suprainfecciones por gérmenes no sensibles tras su uso prolongado.

Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis, y puede aparecer sintomatología gastrointestinal leve (vómito, diarrea).

Interacciones

No usar simultáneamente con antibióticos bacteriostáticos, ya que las penicilinas ejercen su acción inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana durante la multiplicación y por tanto, en principio no es compatible con los antibióticos que inhiben la multiplicación.

No usar simultáneamente con neomicina, ya que bloquea la absorción de las penicilinas orales.

Sobredosificación

Pueden aparecer algunos de los síntomas descritos en reacciones adversas.

En caso de presentarse reacciones alérgicas intensas, suspender el tratamiento y avisar al veterinario. La administración inmediata de epinefrina, corticoide y/o antihistamínico se considera una adecuada terapia de emergencia. En los demás casos, instaurar tratamiento sintomático.

Tiempo de espera

Porcino: Carne: 4 días.

Período de validez

Período de validez: 2 años

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses

Período de validez después de su incorporación en el pienso: 2 meses

Condiciones especiales de conservación

No conservar a temperatura superior a 25 °C

Formato

Sacos de 25 kg

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS

Nº Registro: 2257 ESP

¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí No

09-2011/04