



SUPER'S DIANA, S.L.

FICHA TÉCNICA

1/2

OXISAN PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Datos del fabricante

SUPER'S DIANA, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail: supersdiana@supersdiana.com

Composición

Oxitetraciclina (HCl) 27,5 g

Excipiente c.s.p. 100,0 g

Indicaciones y especies de destino

Cerdos: enteritis bacterianas, rinitis atrófica, leptospirosis.

Terneros: enteritis bacterianas, neumonías, fiebre del transporte.

Posología y modo de administración

Vía oral, mezclado con el pienso.

Dosis:

Cerdos:

* Enteritis bacterianas: Animales menores de 6 semanas de edad: 220 g/Tm de pienso (equivalente a 0,8 kg de OXISAN/Tm de pienso) desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición. Animales mayores de 6 semanas: 110 g/Tm de pienso (equivalente a 0,4 kg de OXISAN/Tm de pienso) desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición.

* Rinitis atrófica: 55 g/Tm de pienso (equivalente a 0,2 kg de OXISAN/Tm de pienso) hasta la remisión de los síntomas.

* Leptospirosis: 550 g/Tm de pienso (equivalente a 2 kg de OXISAN/Tm de pienso), durante 2 semanas.

Terneros:

* Enteritis bacterianas: 110 g/Tm de pienso (equivalente a 0,4 kg de OXISAN/Tm de pienso) desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición.

* Neumonías: 500 g/Tm de pienso (equivalente a 1,82 kg de OXISAN/Tm de pienso) durante 7 a 14 días según la gravedad del curso.

* Fiebre del transporte: 110 g/Tm de pienso (equivalente a 0,4 kg de OXISAN/Tm de pienso) hasta la remisión de los síntomas.

Contraindicaciones

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.

No administrar a animales con alteraciones hepáticas o renales.

Utilización durante la gestación y lactancia

No administrar a hembras en gestación.

Advertencias especiales para cada especie de destino

En cerdos, no administrar entre 2 días antes y 10 días después de la vacunación contra el mal rojo.

Efectos secundarios

Posible sobreinfección de la flora intestinal por predominio de gérmenes resistentes, especialmente hongos.

Interacciones

No administrar de forma conjunta con antibióticos bactericidas.

No administrar con cationes polivalentes (sales de calcio, leche y productos lácteos).

Se presentan resistencias cruzadas entre los miembros del grupo.

Sobredosificación

Alteración de la flora digestiva. Diarreas.

Tiempo de espera

Carne: 7 días.

Período de validez

Período de validez: 3 años

Período de validez una vez abierto el envase: 3 meses

Período de validez después de su incorporación al pienso: 3 meses

Condiciones especiales de conservación

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.



SUPER'S DIANA, S.L.

FICHA TÉCNICA

2/2

OXISAN PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Presentación

Sacos de 25 kg

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS

Nº Registro: 1322 ESP

¿Necesita **Prescripción Veterinaria?** Sí No

07-2011/05