



SUPER'S DIANA, S.L.

FICHA TÉCNICA

VERMIFOR PREMIX

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Datos del fabricante

Super's Diana, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com

Composición

Levamisol (HCl)	7,5 g
Excipiente c.s.p.	100,0 g

Indicaciones y especies de destino

Cerdos: Tratamiento de nematodosis gastrointestinal o pulmonar producidas por los parásitos citados a continuación: *Oesophagostomun* spp., *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi* y *Metastrongylus* spp.

Posología y modo de administración

Vía oral, mezclado con el pienso

Dosis:

Destinado únicamente para cerdos de cría y cebo desde 15 hasta 50 kg de p.v. a dosis de 2 kg de VERMIFOR PREMIX/Tm de pienso. Calcular el peso de los animales a tratar de forma que se les administre el alimento medicado suficiente para que la cantidad del levamisol clorhidrato ingerida sea de 7,5 mg/kg de p.v.

Se debe garantizar el consumo del pienso medicado en el menor intervalo de tiempo posible por lo que se aconseja eliminar el alimento normal durante la noche y administrar el medicado en la primera comida del día.

Contraindicaciones

Evitar su administración en animales depauperados, estresados o con enfermedades intercurrentes.

No administrar a machos reproductores.

No administrar a lechones de peso inferior a 10 kg.

Utilización durante la gestación y lactancia

No administrar a hembras durante el último tercio de la gestación.

Efectos secundarios

Ocasionalmente puede presentarse salivación, tos y vómitos.

Interacciones

No administrar compuestos organofosforados o citrato de dietilcarbamacina desde 14 días antes hasta 14 días después del tratamiento con levamisol. No administrar simultáneamente con compuestos tipo fenotiazina, metiridina o procaína.

Sobredosificación

Los síntomas de intoxicación por sobredosificación se pueden alcanzar con una dosis doble de la recomendada produciéndose síntomas similares a la intoxicación por organofosforados: hiperexcitabilidad, salivación y ligeros temblores musculares. El tratamiento es sintomático.

Tiempo de espera

Carne: 7 días

Período de validez

Período de validez: 3 años

Período de validez para el envase abierto: 3 meses

Período de validez después de su incorporación al pienso: 3 meses

Condiciones especiales de conservación

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Nº de registro: 0924 ESP

Presentación

Sacos de 25 kg

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí No

07-2008/02

ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD