



FICHA TÉCNICA

TETRA - 100
Polvo hidrosoluble oral

Datos del fabricante

Super's Diana, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com

Composición

Tetraciclina (HCl)	20 g
Excipiente c.s.p.	100 g

Indicaciones y especies de destino

Terneros y ovino: Neumonías, Clamidiasis, Leptospirosis
Porcino: Neumonía enzoótica porcina, Listeriosis, Leptospirosis, Mal rojo (sólo en su forma aguda).
Aves: CRD, Micoplasmosis

Posología y modo de administración

Vía oral
Terneros: 0,5 - 1 g de TETRA - 100/10 kg p.v., durante un máximo de 5 días
Ovino: 0,5 - 1 g de TETRA - 100/10 kg p.v., durante un máximo de 4 días
Porcino: 1,5 g TETRA - 100/10 kg p.v. durante un máximo de 3 días en lechones y 4 días en adultos
Aves: 2,5 - 5 g TETRA - 100/10 litros de agua de bebida, durante un máximo de 5 días

Contraindicaciones

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la tetraciclina, con alteraciones hepáticas o renales, o con el rumen funcional. No administrar a équidos.

Efectos secundarios

Inhibición del crecimiento de los huesos largos, alteraciones de la flora digestiva, inmunodepresión en lechones de 2 a 6 semanas, crecimiento de organismos no susceptibles (sobre todo monilias).

Utilización durante la gestación y lactancia

No administrar a hembras en gestación o en lactación.

Interacciones

No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas. Se presenta resistencia cruzada entre los miembros del grupo.

Sobredosificación

Los síntomas de intoxicación por sobredosificación son alteraciones de la flora digestiva, diarreas, inmunodepresión en lechones de 2 a 6 semanas.

Advertencias especiales para cada especie de destino

No administrar a rumiantes con el rumen funcional. No administrar a aves cuyos huevos se destinen al consumo humano. En cerdos, no administrar entre 2 días antes y 10 días después de la vacunación contra el Mal Rojo.

Precauciones especiales para su utilización

La absorción de tetraciclina queda disminuida si se administra conjuntamente con alimentos ricos en cationes divalentes y trivalentes, sobre todo calcio, hierro, magnesio y cobre.

Tiempo de espera

Carne: Ovino, porcino y aves: 5 días. Terneros: 12 días

Condiciones especiales de conservación

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Nº de registro: 0662 ESP

Presentación

20 bolsas de 1 kg

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí No

06-2008/01