



# FICHA TÉCNICA

1/1

## LINCOTRIMEX® SOLUCIÓN INYECTABLE para bovino, ovino y perros

### Datos del fabricante

Super's Diana, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail [supersdiana@supersdiana.com](mailto:supersdiana@supersdiana.com)

### Composición

#### Sustancias activas:

Espectinomina (sulfato tetrahidrato)	100 mg
Lincomicina (hidrocloruro)	50 mg

#### Excipientes:

Alcohol bencílico	9 mg
Otros excipientes, c.s.p.	1 ml

### Indicaciones y especies de destino

**Bovino:** Colibacilosis: *Escherichia coli*

**Ovino:** Neumonía: *Pasteurella* spp., *Mycoplasma*.  
Colibacilosis: *Escherichia coli*

**Perros:** Neumonía: *Pasteurella* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Klebsiella pneumoniae*, *Mycoplasma*.  
Colibacilosis: *Escherichia coli*

Este medicamento se indica para el tratamiento de las anteriores enfermedades, cuando estén causadas por microorganismos sensibles a la asociación espectinomina/lincomicina.

### Posología y modo de administración

Todas las especies: 10-20 mg de espectinomina + 5-10 mg de lincomicina/kg p.v. (equivalente a 1-2 ml de LINCOTRIMEX SOLUCIÓN INYECTABLE/10 kg p.v.) por vía intramuscular cada 12 horas, durante 4-7 días.

### Contraindicaciones

- No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la lincomicina o a la espectinomina.
- No administrar a caballos, ya que la lincomicina produce colitis hemorrágica y diarrea con resultados muy graves.
- No administrar a animales que padezcan infecciones preexistentes por *Monilia* spp.

### Uso durante la gestación la lactancia o la puesta

No administrar a hembras gestantes o en lactación.

### Reacciones adversas

Después de la administración intramuscular puede presentarse dolor e irritación local.

### Interacciones

No administrar conjuntamente con macrólidos ni aminoglucósidos.

### Sobredosificación

En general a dosis 3 veces la dosis terapéutica el único síntoma que presenta es la irritación local.

### Tiempo de espera

Bovino y ovino: Carne: 14 días

Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.

### Período de validez

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 12 meses

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días

### Precauciones especiales de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30 °C

### Formatos

Vial de 100 ml y 250 ml

Nº Registro: 2265 ESP

### USO VETERINARIO

#### ADMINISTRACIÓN BAJO CONTROL O SUPERVISIÓN DEL VETERINARIO

¿Necesita Prescripción Veterinaria?    Sí     No

03-2011/01