



SUPER'S DIANA, S.L.

## FICHA TÉCNICA

### SUIDOX Polvo oral

POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL ADMINISTRADO EN AGUA DE BEBIDA

#### Datos del fabricante

Super's Diana, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 PARETS DEL VALLÈS

Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail [supersdiana@supersdiana.com](mailto:supersdiana@supersdiana.com)

#### Composición

Doxiciclina (hiclato) 500 mg

Excipiente c.s.p. 1 g

#### Indicaciones y especies de destino

Porcino (cerdos de cebo).

Complejo Respiratorio Porcino donde se encuentren implicados *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* y/o *Bordetella bronchiseptica*, sensibles a la doxiciclina.

#### Posología y modo de administración

Vía oral en el agua de bebida

Dosis: 10 mg de doxiciclina por kg de peso vivo por día. Dicha posología se consigue administrando el producto a la concentración de 0,2 g **SUIDOX Polvo oral** por 1,0 litro de agua, que equivale a 100 mg doxiciclina/litro de agua de bebida/día. La duración del tratamiento será de 5 días.

Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

#### Contraindicaciones

No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.

No administrar a animales con alteraciones hepáticas.

#### Precauciones particulares de empleo

Evitar su administración en bebederos oxidados.

No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.

Manipular el producto con cuidado para evitar el contacto durante su incorporación al agua, así como durante la administración del agua medicada a los animales, tomar precauciones específicas.

Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

#### Uso durante la gestación, la lactancia o puesta

No se recomienda su uso durante la gestación y la lactancia.

#### Reacciones adversas

Al igual que todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.

#### Interacciones

La absorción de la doxiciclina puede disminuir con la presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al de la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

#### Tiempo de espera

Carne: 7 días.

#### Período de validez

Período de validez: 2 años

Período de validez una vez abierto el envase primario: 3 meses

Período de validez del agua medicada: 12 horas

#### Precauciones especiales de conservación

Conservar en lugar seco, fresco (temperatura inferior a 25 °C) y protegido de la luz.

#### Presentación

Caja de 10 kg (en 50 bolsas de 200 g)

Caja de 20 kg (en 20 bolsas de 1 kg)

#### USO VETERINARIO

#### ADMINISTRACIÓN BAJO CONTROL O SUPERVISIÓN DEL VETERINARIO

¿Necesita Prescripción Veterinaria?

Sí

No

Nº de Registro: 1585 ESP